



Obr. 1 a 2: Hnízdiště břehulí říčních na Litavce u Pičinského mlýna (PB), 4.7.2004 (k článku na str. 3).

*Fig. 1 and 2: Breeding site of the Sand Martin on Litavka river near Pičinský mlýn (PB), 4<sup>th</sup> July 2004 (see page 3).*



Obr. 3 a 4: Hnízdiště břehulí říčních na erodované výsypce dolu Silvestr u Sokolova (SO), 6.8.2004 (k článku na str. 3).

*Fig. 3 and 4: Breeding site of the Sand Martin on an eroded spoil bank of Silvestr mine near Sokolov (SO), 6<sup>th</sup> August 2004 (see page 3).*



Obr. 5: Hnízdiště břehule říční ve stěně vzniklé při výkopech základů pro novostavbu ve Strachotíně (BV). 3.7.2004 (k článku na str. 3).

*Fig. 5: Breeding site of the Sand Martin in the face of foundation excavations in Strachotín (BV). 3<sup>rd</sup> July 2004 (see page 3).*





Obr. 6: Zámecký most v Blatné. Ve spárách hnízí početná kolonie břehulí. 5.8.2003 (k článku na str. 3).

*Fig. 6: Chateau bridge in Blatná. Numerous colony of the Sand Martins breeds in the fissures of the brickwork. 5<sup>th</sup> August 2003 (see page 3).*



Obr. 7: Hnízdiště břehulí říčních v otvorech železničního mostu u Klenovic (TA), 5.8.2003. Foto 1–7: P. Heneberg (k článku na str. 3).

*Fig. 7: Breeding site of the Sand Martins in holes of railway bridge near Klenovice (TA), 5<sup>th</sup> August 2003. Photo 1–7: P. Heneberg (see page 3).*



Obr. 8 a 9: Leucistická juvenilní pěnice černohlavá odchycená v Železném Brodě 9.8.2005. Foto: J. Klápštová (k článku na str. 69).

*Fig. 8 and 9: Leucistic juvenile Blackcap caught in the town Železný Brod on 9<sup>th</sup> August 2005. Photo: J. Klápštová (see page 69).*



Obr. 10: Samice lindušky luční zašlápnutá na hnízdě při zahřívání malých mláďat.  
Foto: V. Pavel (k článku na str. 73).

*Fig. 10: Incubating female Meadow Pipit trampled by the grazing animals, Photo: V. Pavel (see page 73).*



Obr. 11: Dvoukusová snůška jeřába popelavého (*Grus grus*) na ostrůvku Bohdanečského rybníka. Foto: F. Bárta (k článku na str. 79).

*Fig. 11: Two-egg clutch of the Common Crane (*Grus grus*) on a little island in Bohdanečský pond. Photo: F. Bárta (see page 79).*





Obr. 12: Snůška motáka lužního (*Circus pygargus*) u obce Žehuň (střední Čechy). Foto: M. Polák (k článku na str. 91).

Fig. 12: Clutch of the Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) near Žehuň village (Central Bohemia). Photo: M. Polák (see page 91).



Obr. 13: Hnízdní biotop motáka lužního (*Circus pygargus*) u obce Žehuň (střední Čechy). Foto: M. Polák (k článku na str. 91).

Fig. 13: Breeding habitat of the Montagu's Harrier (*Circus pygargus*) near Žehuň village (Central Bohemia). Photo: M. Polák (see page 91).



Obr. 14: Hnízdo volavky popelavé (*Ardea cinerea*) v rákosí. Foto: Vladimír Šoltys (k článku na str. 95).

Fig. 14: Nest of the Grey Heron (*Ardea cinerea*) in reed rushes. Photo: Vladimír Šoltys (see page 95).



Obr. 15: Průsek v rákosí sloužící k odchytu ptáků – místo výskytu lindušky rudokrké (*Anthus cervinus*). Žehuňský rybník (střední Čechy). Foto: M. Jelínek (k článku na str. 113).

Fig. 15: Corridor in the reed used for catching birds – a place of occurrence of the Red-throated Pipit (*Anthus cervinus*). Žehuňský pond (central Bohemia). Photo: M. Jelínek (see page 113).