

## Hohol severní (*Bucephala clangula*) hnízdil na Bohdanečském rybníku (o. Pardubice)

Goldeneye (*Bucephala clangula*) was nesting on the Bohdanečský fishpond near Pardubice (East Bohemia)

Vladimír Lemberk

Hohol severní (*Bucephala clangula*) zahnízdil na území České republiky po prvé v roce 1960 na Třeboňsku (HUDEC et al., 1994). Od té doby hnízdí v celku pravidelně nejen v jihočeských rybničních pánvích, ale rovněž v Poodří na Moravě (HUDEC, 1.c.).

Ojedinělé případy hnízdění jsou ovšem známy také z Pardubicka. V roce 1967 hnízdil 1 páru na rybníku Nová Jílovka u Lázní Bohdaneč (ŠTANCL, 1970) a v roce 1971 1 páru na rybníku Černý Nadýmač u Habřiny Vlčí (ŠTANCL et ŠTANCLOVÁ, 1977). Pokusy o zahnízdění byly počátkem 90. let několikrát zaznamenány také na rybníku Velký Karlov u Čermné nad Orlicí (KOZA in verb.), kde v roce 1994 jeden páru úspěšně vyvedl mladé (BĚLKA et KOZA in verb.).

27. května 1997 byla u Dolanské hráze Bohdanečského rybníka (o. Pardubice) pozorována samice hohola severního, jejiž chování nasvědčovalo hnízdění. Samice mě vzrušeně obletovala a vydávala výstražné zvuky. Mláďata se mi však nalézt nepodařilo.

10. června 1997 jsem prakticky na stejném místě na okraji rákosového porostu pozoroval samici hohola severního vodící 6 mláďat. Mláďata byla minimálně 14 dní stará, takže jejich líhnutí připadá pravděpodobně na 20.-25. května a počátek inkubace na 21.-26. dubna. To odpovídá údajům z literatury (HUDEC et al., 1994), podle kterých počátek snášení připadá průměrně na 2. polovinu dubna.

K vyhnízdění hoholů na Bohdanečském rybníce došlo s největší pravděpodobností v přirozeně dutině starých stromů (většinou duby letní, olše lepkavé a topoly černé) zarůstajících Dolanskou hráz na severozápadním okraji rybníka. Přestože 1 samce a 2 samice hohola severního zde pozoroval REJL (in verb.) již 7.3.1997, jednalo se v tomto případě téměř jistě o zimující respektive protahující jedince, pozorované zde v různém počtu zejména koncem zimy takřka každým rokem.

Prokázané hnízdění hohola severního v Národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník Matka zvyšuje oprávněnost ornitologického výzkumu, který zde v posledních letech probíhá. Zároveň nastoluje otázku, zda by v rámci péče o toto chráněné území nebylo vhodné umístění několika budek pro hoholy do břehových porostů Bohdanečského rybníka.

### Summary

Nesting of Goldeneye (*Bucephala clangula*) has been evidenced by occurrences of six youngs (with female) on the Bohdanečský fishpond near Pardubice (East Bohemia, square of 5960a) on May 27<sup>th</sup> and June 10<sup>th</sup> 1997.

### Literatura

HUDEC K. et al., 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. Academia, Praha.

ŠTANCL F., 1970: Hnízdění hohola severního na rybníku Nová Jílovka u Pardubic.

Zprávy MOS, 1970: 86-87.

ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H., 1977: Ptactvo rybníka Černý Nadýmač u Habřiny

Vlčí a v jeho okolí (okres Pardubice). Zprávy MOS, 1977: 21-26.

**Adresa autora:**

Mgr. Vladimír Lemberk

Východočeské muzeum

Zámek 2

530 02 Pardubice