

## První potvrzené hnízdění slavíka modráčka středoevropského (*Luscinia svecica cyanecula*) na Svitavsku

*The first confirm breeding of White-spotted Bluethroat (Luscinia svecica cyanecula) in the Svitavy microregion*

Jakub VRÁNA<sup>1</sup> & Luboš NOVÁK<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Riegrova 15, 568 02, Svitavy; e-mail: kuba.vrana@email.cz

<sup>2</sup> Riegrova 6, 568 02, Svitavy; e-mail: lubos.birder@email.cz

Slavík modráček (*Luscinia svecica*) je pěvec s palearktickým typem rozšíření (ŠŤASTNÝ & HUDEC 2011). Velikost jeho evropské populace se pohybuje mezi 540 000 až 1 400 000 páry (HAGEMEIJER & BLAIR 1997). V České republice se přitom setkáváme s dvěma podruhy. Zatímco slavík modráček tundrový (*L. s. svecica*) hnízdí výlučně v Krkonoších nad hranicí lesa v arkoalpínské tundře, slavík modráček středoevropský (*L. s. cyanecula*) je rozšířen plošněji v nižších polohách a jeho početnost byla při posledním sčítání ptáků ČR stanovena na 400–600 párů (ŠŤASTNÝ *et al.* 2006). Těžištěm jeho výskytu jsou jižní Čechy, šíří se ale i do dalších oblastí (GRIM 1991, KLÁPŠTĚ & KLÁPŠŤOVÁ 2009) včetně východních Čech (KVEREK 1992, REJL & BARTA 1992, ČESÁK 2006, ŠŤASTNÝ 2009).

Na Svitavsku bývá v předchozích desetiletích zaznamenáván nepravidelně hlavně v době jarního tahu (JETMAR 2000, VRÁNA 2008). V posledních letech je sice zjišťován častěji (J. Mach *in litt.*) a byli zdokumentováni i zpívající samci (VRÁNA & MACH 2011, VRÁNA & KADAVA 2015), první hnízdění však bylo prokázáno až roku 2017 na Lánském rybníce u Svitav (Pardubický kraj, rozloha cca 7 ha, kvadrát 6264, koordináty 49°44'36" N, 16°27'60" E, nadmořská výška 433,5 m n. m.). Pozorování přitom pochází z obnažených břehů rybníka a ze severozápadní části lokality, kde poměrně rozsáhlé litorální porosty přechází v mokřad. Ten je tvořen především ostřicemi (*Carex* spp.), jež místy doplňují rákos obecný (*Phragmites australis*), orobinec široolistý (*Typha latifolia*) a různé vrby (*Salix* spp.; P. Lustyk *in litt.*).

Poprve zde byl tento druh v daném roce nalezen 2. 4., kdy M. Janoušek objevil jednoho samce. Samice sbírající potravu do zobáku byla zjištěna 29. 4. L. Novákem, který ji při této činnosti opakovaně pozoroval i v průběhu května. J. Vrána pak dne 23. 7. od 5.00 do 6.30 odchytil a okroužkoval celkem tři vyvedená mláďata. Všechna mláďata již byla dobře opeřená a vzletná. Vzhledem k dorůstajícímu krycímu perí na těle a hlavě (obr. 1) se po konzultaci s odborníky (P. Kverek *in litt.*, R. Lučan *in litt.*) došlo k závěru, že jde o potomky páru, který vyhnízdil na lokalitě.

Přestože zpívající modráčci jsou již od roku 2010 (VRÁNA & MACH 2011) zaznamenáváni také na rybnících u Opatova, nebylo zahnízdění v této oblasti dosud prokázáno. Výše popsané nálezy tak skutečně dokládají první potvrzené hnízdění v rámci celého regionu. Potěšitelné přitom je, že proběhlo úspěšně.



**Obr. 1:** Jedno z mláďat slavíka modráčka středoevropského (*Luscinia svecica cyanecula*) odchycených dne 30. 7. 2017 na Lánském rybníku u Svitavy. Foto: J. Vrána.

**Fig. 1:** Ringed juvenile White-spotted Bluethroat (*Luscinia svecica cyanecula*) at the Lánský pond near the town of Svitavy, 30<sup>th</sup> July 2017. Photo by J. Vrána.

## SOUHRN

V roce 2017 bylo zjištěno hnízdění jednoho páru slavíka modráčka středoevropského (*Luscinia svecica cyanecula*) na Lánském rybníce u Svitavy (Pardubický kraj, rozloha cca 7 ha, kvadrát 6264, koordináty 49°44'36" N, 16°27'60" E, nadmořská výška 433,5 m n. m). Během dubna a května tu byli opakovaně pozorováni dospělí ptáci včetně samice sbírající potravu. Dne 30.7. došlo k odchytu třech vyvedených mláďat. Jedná se o první prokázané vyhníždění tohoto druhu na Svitavsku.

## SUMMARY

*In 2017 a pair of White-spotted Bluethroat (Luscinia svecica cyanecula) nested at the Lánský pond near the town of Svitavy (the Pardubický region, Grid no. 6264, coordinates 49°44'36" N, 16°27'60" E, altitude 433,5 m a.s.l.). Female who collected a food for offspring was repeatedly observed during April and May. Three young were ringed on the 30<sup>th</sup> July. These records represent the first confirmed breeding of this species in the Svitavy microregion.*

## LITERATURA

- ČESÁK J. 2006: Přírodní rezervace Baroch – nové hnízdiště slavíka modráčka středoevropského (*Luscinia svecica cyanecula*). *Panurus* 15: 101–102.
- GRIM T. 1991: Zahníždění slavíka modráčka středoevropského (*Luscinia svecica cyanecula* Meisner, 1984) na Českomoravské vrchovině. *Moravský ornitolog* 3: 15–16.

- HAGEMEIJER E. J. M. & BLAIR M. J. (eds) 1997: *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & AD Poyser, London.
- HUDEC K. & ŠŤASTNÝ K. (eds) 2011: *Fauna ČR. Ptáci 3/1*. Academia, Praha.
- JETMAR F. 2000: Výskyt a změny početnosti ptáků na soustavě rybníků u Opatova. *Sylvia* 36: 127–153.
- KLÁPŠTĚ J. & KLÁPŠŤOVÁ J. 2009: Slavík modráček středoevropský (*Luscinia svecica cyanecula*) vyhníždil na rybníku Žabakor v Českém ráji. *Crex* 29: 149–152.
- KVEREK P. 1992: Slavík modráček středoevropský (*Luscinia svecica cyanecula*) na úpatí Českého ráje. *Panurus* 4: 73–76.
- REJL J. & BÁRTA F. 1992: Slavík modráček středoevropský (*Luscinia svecica cyanecula*) hnízdí v NPR Bohdanečský rybník (okr. Pardubice). *Práce a studie* 4: 177–178.
- ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V., HUDEC K. (eds) 2006: *Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice*. Aventinum, Praha.
- ŠŤASTNÝ V. 2009: Slavík modráček středoevropský (*Luscinia svecica cyanecula*) vyhníždil u Turnova v Českém ráji. *Panurus* 18: 43–52.
- VRÁNA J. 2008: *Avifauna svitavského Dolního a Horního rybníka v letech 2004–2007*. Práce SOČ, nepublikováno.
- VRÁNA J. & KADAVA L. 2015: Ornitologická pozorování. *Panurus* 24: 69–108.
- VRÁNA J. & MACH J. 2011: Ornitologická pozorování. *Panurus* 20: 193–220.

