

NÁLEZ ALBÍNŮ ROPUCHY ZELENÉ (*BUFO VIRIDIS*) NA OKRESE CHRUDIM

Find of albinotic Green toads (*Bufo viridis*)
in Chrudim district (East Bohemia)

Josef CACH

ZO ČSOP 44/01, Na rozhledně 813, 537 01 Chrudim

Ropucha zelená (*Bufo viridis*) obývá většinou otevřenou krajinu, včetně hospodářsky obdělávaných ploch, žije i v okolí lesních rybníků, ve vsích i městech (BARUŠ, OLIVA et al. 1992).

Na Chrudimsku byla v rámci projektu mapování vodních ploch s výskytem obojživelníků zaznamenána na více než 150 lokalitách různého charakteru (rybníky, lomy, tůně, písničky, hasičské nádrže).

Zajímavý nález byl učiněn letos na jaře (26.5.1997) při kontrole menšího rybníčku v obci Řepníky. Kromě tisíců normálně zbarvených pulců ropuchy zelené (*Bufo viridis*) zde bylo nalezeno pět albínů. Albíni byli převezeni do Centrální stanice ochrany fauny na okrese Chrudim, kde byli chováni v umělých podmínkách. U všech jedinců zůstalo plně zachováno albinotické zbarvení i po metamorfóze (včetně charakteristické červené duhovky). V listopadu 1997 dosahovali tři jedinci délky zhruba 15 mm a dva jedinci přibližně 40 mm.

Lokalita bude i v následujících letech sledována za účelem získání informací o případných dospělých albinotických jedincích ropuchy zelené.

Summary

There were found tadpoles of Green toad (*Bufo viridis*) in little pond (near Řepníky, Chrudim district, square of 6062d). Now after metamorphose (in captivity) we have little albinotic toads.

Literatura

BARUŠ V., OLIVA O. et al., 1992 Fauna ČSFR Obojživelníci. Academia, Praha: 166-172.

Došlo: 26.11.1997



Obr. 1: Pulec albinotického jedince ropuchy zelené. Foto: J. Cach.
Fig. 1: Albinotic tadpole of Green toad. Photo: J. Cach.



Obr. 2: Subadultní albinotický jedinec ropuchy zelené. Foto: J. Cach.
Fig. 2: Young albinotic specimen of Green toad. Photo: J. Cach.