

HNÍZDĚNÍ HÝLA RUDÉHO (*Carpodacus erythrinus*)
U LIPNICE NAD SÁZAVOU V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD

THE BREEDING OF SCARLET ROSEFINCH (*Carpodacus erythrinus*)
NEAR LIPNICE IN THE DISTRICT OF HAVLÍČKŮV BROD

Ivan Kunstmüller

ÚVOD

Hýl rudý (*Carpodacus erythrinus*) je druh s palearktickým typem rozšíření. Hýl rudý evropský obývá Evropu a západní Sibiř. Tažný druh, zimující v jižní Asii od Iráku po Indočínu (HUDEC a kol. 1983). V ČSFR hnízdí převážně ve východní části území, v posledních letech neustále rozšiřuje svůj hnízdní areál směrem na západ (ŠTASTNÝ a kol. 1987).

POPIS LOKALITY

Hnízdní lokalita se nachází v SZ části Českomoravské vysočiny na bažinatých loukách na přítoku rybníka Kamenná trouba, západně od obce Lipnice n. Sáz. v okrese Havlíčkův Brod ve výši 480 m m.m. Jedná se o rozsáhlejší terénní proláklinu s typickou bahenní květenou, s rákosovými porosty, s roztroušenými porosty olší, vrb a keřovitých vrbin.

HNÍZDĚNÍ

Dne 11.6.1990 jsem na uvedené lokalitě zaslechl zpěv samce hýla rudého (*Carpodacus erythrinus*), kterého jsem zde slyšel zpívat už v loňském hnízdním období. Po krátkém párání po vrcholcích keřů, rostoucích na bažinaté louce, jsem spatřil na jednom z keřů zpívajícího, krásně karmínově vybarveného samce. Poté zalétl do porostu tužebníku jilmového (*Filipendula ulmaria*), tato statná bylina tvoří převládající vegetaci v hnízdním biotopu. Asi po 3 minutách samec z porostu vzlétl a usedl na vyšší suchou bylinu a zde si začal důkladně otírat zobák o stonek bylinky. To nasvědčovalo, že asi krmil na hnízdě, které se mi pak podařilo celkem snadno najít. Sedící samici jsem vyrušil, až když jsem se dotkl hnízda, ve kterém byla 6 kusová snůška vajec jasně modré barvy, na tupém pólu jemně černohnědě skvrněných.

Popis hnízda - základ postaven ze suchých travin a stébel, kotlinka byla jen z jemných travin, samotné hnízdo bylo upevněno u stonku tužebníku jilmového. Hnízdo bylo nakloněné a chatrně upevněno, takže jsem ho musel odspodu podložit suchými stonky. Nad bahnitým terénem bylo 60 cm vysoko. Hnízdo jsem fotografoval a místo si označil; samice stále přeletuje v obloucích v těsné blízkosti. Poté jsem porost opustil a asi ze 100 m pozoroval jak se samice ihned na hnízdo vraci. Samec začal přeletovat z keře na keř a opět začal zpívat. Po půl hodině zaletuje ke hnízdu, po několika minutách vylétl z porostu a usedl na suchou bylinu a opět si otíral zobák. To dokazuje, že samici během inkubace na hnízdě krmí.

Při další návštěvě lokality dne 22.6.1990 bylo v hnízdě již 6 mláďat, ještě holých, vidících, s plně vyvinutými pouzdry. Přes holá holátka bylo jasné vidět obsah potravy, celá semínka (žlutá, zelená, červená) různých bylin. Samice neseděla (bylo polojasno, teplo, +23° C), oba starí ptáci krmili. Na hnízdě se nezdrželi déle než-li 1,45 min., po nakrmení odnášeli trus, který za letu po 20-30 metrech pouštěli. Tento den mohlo být mládatům 6-7 dní a byla okroužkována.

Lokalitu jsem opět naštívil 28.6. 1990 a už při vstupu do porostu tužebníku jilmového začali starí ptáci přeletovat nad porostem a varovně volat. Bylo jasné, že už vyvedli, což potvrdila kontrola hnízda, které bylo prázdné, hnízdní kotlinka se šlapána, plná prachu z rozpadlých pouzder, na okrajích hnízda byl trus. Tento den bylo mládatům 12-13 dní, po zpětném propočtu byl začátek snůšky pravděpodobně 30.5., při inkubaci od 3.6. do 15.6.1990. Úspěšným vyvedením mladých bylo tak doloženo první hnízdění hýla rudého v okrese Havlíčkův Brod.

SOUHRN

Již v roce 1989 byl na bažinaté lokalitě v nadmořské výšce 480 m u Lipnice nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod pozorován a slyšen zpívající samec hýla rudého (*Carpodacus erythrinus*). Dne 11.6.1990 bylo nalezeno hnízdo se snůškou 6 vajec, samice pevně sedí a samec ji na hnízdě krmí. Hnízdo bylo umístěno v tužebníku jilmovém (*Filipendula ulmaria*), 60 cm nad bahnitým terénem. 22.6. na hnízdě 6 mláďat, holých, vidících, ve stáří 6-7 dní, jež oba starí krmí. Dne 28.6. hnízdo prázdné, mládata vyvedená v porostu, nad kterým starí ptáci přeletují a varovně volají. Podle zpětného přepočtu byl začátek snůšky

pravděpodobně 30.5.1990. Mladí ptáci byli ve stáří 6-7 dní krmeni bylinnými semínky, které bylo možno vidět v holých volátkách. Jedná se o první doložené hnízdění v okrese Havlíčkův Brod.

SUMMARY

The breeding of Scarlet Rosefinch (*Carpodacus erythrinus*) near Lipnice in the district of Havlíčkův Brod is described. It is the first breeding that is supported from this part of the Bohemian and Moravian hills.

LITERATURA

- Černý, W., 1980: Ptáci. Praha: 230.
Hudec, K. a spol., 1983: Fauna ČSSR. Ptáci III/2. Praha: 1071 - 1077.
Šťastný, K., Randík, A., Hudec, K., 1987: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Praha: 440 - 441.

Adresa autora:

Ivan Kunstmüller
Žižkov II/1279
580 01 Havlíčkův Brod