

VÝSKYT VOLAVKY BÍLÉ (*EGRETTA ALBA* L.) A RYBÁKA BAHENŇÍHO (*CHLIDONIAS HYBRIDA* PALL.) NA HOŘICKU (OKR. JIČÍN)

Occurrence of Gret (*Egretta alba* L.) and Wiskered Tern (*Chlidonias hybrida* Pall.)
near Hořice (East Bohemia)

Karel PRSKAVEC

V posledních letech jsou stále častěji publikovány informace o výskytu volavky bílé (*Egretta alba* L.) a rybáka bahenního (*Chlidonias hybrida* Pall.) ve východočeském regionu. Protože se jedná o druhy, které zde byly v dřívějších letech velmi vzácné, rád bych doplnil údaje o jejich výskytu z okolí Hořice v Podkrkonoší.

Volavka bílá

V našich zemích se začala pravidelně vyskytovat na jižní Moravě po roce 1945. V posledních letech pravidelně zaletuje i do jižních Čech (HUDEC et al., 1994). Z východočeského regionu uvádějí ŠTANCL et ŠTANCLOVÁ (1987), že na Pardubicku byla pozorována od roku 1971, dále pak v roce 1977, 1978, 1980, 1981. Na Újezdském rybníku byla pozorována v roce 1977, 1980, 1985, 1986 (ČESÁK, 1995). Z oblasti nynější přehrady Rozkoš (okr. Náchod) je uváděna též od roku 1971, později pak v roce 1983 (ŽDÁREK, 1987). V oblasti Bohdanečska se pravidelně vyskytovali 2 - 4 ex. během července až září roku 1993 (POTŮČEK, 1995).

Z našich sledování na Hořicku byl tento druh pozorován u rybníka Buben v letech 1983 a 1993. Lokalita se nachází u severozápadní hranice čtverce 5660, asi 4 km SV od Hořic. Prvý výskyt v roce 1983 byl ve dnech 13. a 14.8., 7 ex. a 30.8., 3 ex. Druhý výskyt v roce 1993 byl sledován za pomoci D. Čípa a to 13.8., 1 ex. a dne 9. a 11.9., 2 ex.

Rybák bahenní

Na hranici východočeského regionu, konkrétně na rybníku Žehuň, byl prvně pozorován v roce 1988 (URBÁNEK et al., 1983). Nedaleko Přelouče byl 1 ex. pozorován v roce 1989 (ŠTANCL et ŠTANCLOVÁ, 1992). Jak autoři uvádějí, na Pardubicku se tento druh vyskytl opětovně po sto letech. Na Svitavsku bylo prvé zjištění rybáka bahenního v roce 1994 (JANOŮŠEK, 1995).

Na Hořicku jsme prvně zjistili 1 ex. rybáka bahenního dne 6.6.1992 u rybníka Temník (5659), 7 km JZ od Hořic. Bylo to v odpoledních hodinách, kdy po celou dobu našeho asi půlhodinového pozorování, prováděl za přítomnosti racků chechtavých (*Larus ridibundus*), své neúnavné akrobatické lety. Přitom se bez jakéhokoliv přemístění udržoval stále v jediném prostoru. Při opětovných návštěvách lokality v dalších dnech jsme tento druh již nezastihli, a to ani na dalších okolních rybnících.

SOUHRN

Práce doplňuje údaje o výskytu dvou vzácných druhů (*Egretta alba* a *Chlidonias hybrida*) v regionu východních Čech, které svědčí o jejich šíření.

SUMMARY

The paper supplements data about the occurrence of two rare species (*Egretta alba*, *Chlidonias hybrida*) in East Bohemia region, confirming their expansion.

LITERATURA

- ČESÁK, J., 1995: Ptactvo Újezdského rybníka a jeho blízkého okolí. *Panurus*, 6: 1-46.
- HUDEC, K., et al., 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci I. Academia, Praha: 297-302.
- JANOUSEK, M., 1995: Výskyt rybáka bělokřídleho (*Chlidonias leucoptera* Temm.) a rybáka bahenního (*Chlidonias hybrida* Pall.) na Svitavsku. *Panurus*, 6: 103-104.
- POTŮČEK, J., 1995: Opětovné pozorování volavky bílé (*Egretta alba*) v okolí Bohdanečského rybníka /o. Pardubice/. *Panurus*, 6 : 99-100.
- ŠTANCL, L., ŠTANCLOVÁ, H., 1987: Ptactvo Pardubicka II. Bohdanečsko. Pardubice: 15.
- ŠTANCL, L., ŠTANCLOVÁ, H., 1992: Pozorování rybáka bahenního (*Chlidonias hybrida* Pall.) po sto letech opět na Pardubicku. *Panurus*, 4: 89-90.
- URBÁNEK, L., et al., 1993: Zpráva o problematice NPR Žehuňský rybník: 23.(ms).
- ŽDÁREK, P., 1987: Ptactvo údolní nádrže Rozkoš. Sborník VČP ČSO, Pardubice, 9: 34.

ADRESA AUTORA:

Karel Prskavec
Maixnerova 868
508 01 Hořice v Podkrkonoší