

## Ornitologické zajímavosti

### Ornithological notes

**Martin Paclík (ed.)**

Dolany 90, 533 45; e-mail: martin.paclik@post.sk

Rubrika Ornitologické zajímavosti v tomto čísle časopisu Panurus přináší opět několik pozoruhodných pohledů do ptačího života. Hned dvakrát se zde můžete dočíst o přizpůsobivosti a životaschopnosti našich sýkor, konkrétně sýkory modřinky (*Cyanistes caeruleus*). V prvním případě je popisováno umístění hnízda v kovovém sloupku závory přes lesní cestu. Jak je vidět, sýkory si „rády“ staví hnízda v takto umělých předmětech namísto v přirozených stromových dutinách, a to nejen v městském prostředí, kde je tento jev zřejmě častější (nebo alespoň nápadnější), ale i ve svém původním lesním prostředí. Druhý příspěvek o sýkoře modřince se týká ztráty prstů u jedince pozorovaného na krmítku. Podle opakovaných pozorování se pták s touto ztrátou po nějakém čase vyrovnal. Třetí příspěvek Ornitologických zajímavostí se taktéž zabývá abnormalitou na ptačím těle, v tomto případě nejspíše vrozenou, a to konkrétně přerostlým a deformovaným zobákem u racka bělohlavého (*Larus cachinnans*). Čtvrtý příspěvek se týká abnormálního zbarvení peří, konkrétně leucismu u kosa černého (*Turdus merula*). Příspěvek je o to zajímavější tím, že jeho autorem je žákyně základní školy v Jilemnici a svůj příspěvek vytvořila společně se svojí paní učitelkou přírodopisu. Poslední příspěvek popisuje pozorování dvou neobvyklých hostů na Labi v Ústí nad Labem – pravděpodobného křížence husy polní (*Anser fabalis*) s husou čínskou (*Cygnopsis cygnoides*) a jedince čírky modrozobé (*Anas versicolor*), který unikl z ústecké ZOO.

*In this volume of Ornithological notes the reader can find out twice about the adaptability and viability of tits, in particular the Blue Tit (Cyanistes caeruleus). In the first case a pair of Blue Tits constructed a nest in a hollow metal stake of a gate at the forest edge, an environment which surely provides a selection of more natural breeding opportunities. The second note concerns a case of toe loss in a Blue Tit frequenting a bird feeder, a handicap with which the bird was apparently coping well. Next contribution describes another disability, in this case probably congenital, an overgrown and deformed bill of a Caspian Gull (Larus cachinnans). The fourth case deals with an observation of a leucistic Common Blackbird (Turdus merula) – a special feature of this contribution being the fact that it was written by a grammar school pupil with the help of her natural history teacher. The last case deals with an observation of supposed hybrid between Bean Goose (Anser fabalis) and a Swan Goose (Cygnopsis cygnoides), together with the observation of Silver Teal (Anas versicolor), known to escape from the ZOO of Ústí nad Labem town.*

### **Hnízdění sýkory modřinky (*Cyanistes caeruleus*) v kovovém sloupku na okraji lesa**

[*Blue Tit (Cyanistes caeruleus) breeding in a hollow metal stake at the forest edge*]

Dne 28.5.2011 jsme v odpoledních hodinách spolu s kolegý A. Holubem a J. Vaňkem zkoumali výskyt ptáků v lesním celku nacházejícím se jižně od

obce Martínkovice (koordináty 50°32'N 16°19'E, kvadrát 5464, nadmořská výška 440 m n.m.). Les se rozprostírá v rovinatém terénu u paty Broumovských stěn, severním směrem na něj navazují rozsáhlá pole v Broumovské kotlině. V tomto místě se jedná převážně o kulturní porosty s převahou smrku ztepilého (*Picea abies*), ještě v předmýtním věku. Při míjení závory u cesty na okraji zmíněného lesa jsme zaslechli intenzivní žadonění ptačích mládřat vycházející z dutiny v kovovém sloupku závory (obr. 1). S ohledem na nedostatek prostoru a špatné světelné podmínky ve sloupku se nám nepodařilo zjistit ani ptačí druh ani počet mládřat. Nepodařilo se také zaznamenat přilet rodičů s potravou, i když jsme na místě, přibližně ve vzdálenosti 20 metrů od hnízda, setrvali minimálně 45 minut. Dne 29.5.2011 jsme se na lokalitu vrátili a s pomocí kapesní svítilny určili, že šlo o mládřata sýkory modřinky (*Cyanistes caeruleus*). V opeření mládřat již byla patrna obrysová pera, přesný věk a počet jedinců však nešlo vzhledem k obtížné přístupnosti dutiny určit. Přilet rodičů do hnízda nebyl opět zaznamenán ani po dobu cca 30 minut, kterou jsme u hnízda strávili. Mladí ptáci nejevili známky pohybu a nevydávali ani žádné zvuky. Osud hnízda tedy není znám. Zajímavé je, že kromě intravilánu obcí, kde ptáci vyhledávají lidských staveb jako hnízdního prostředí vcelku běžně, může dojít k využití umělých artefaktů pro hnízdění také v lesním prostředí. Svou roli zřejmě sehrál i potenciální nedostatek dutin v okolních smrkových porostech. Popsané pozorování proběhlo v rámci Víkendového výzkumného tábora Východočeské pobočky České společnosti ornitologické v oblasti Broumova.

M. Fejfar



**Obr. 1:** Detail kovového sloupku s hnízdem sýkory modřinky (*Cyanistes caeruleus*), Martínkovice, 29.5.2011. Foto: M. Fejfar.

**Fig 1:** A detailed view of the metal stake with Blue Tit nest (*Cyanistes caeruleus*), Martínkovice, 29.5.2011. Photo by M. Fejfar.

### Ztráta prstů u sýkory modřinky (*Cyanistes caeruleus*)

[*Toe loss in a Blue Tit (Cyanistes caeruleus)*]

Dne 8.1.2012 jsem pozoroval na svém krmítku v Jilemnici (koordináty 50°37'N 15°30'E, kvadrát 5359, nadmořská výška 464 m n.m.; balkón nad ulicí v centru města u městského parku) sýkoru modřinku (*Cyanistes caeruleus*), která vždy při krmení seděla na břiše a po ploše krmítka se pohybovala s obtížemi. Po detailnějším sledování jsem zjistil, že minimálně na jedné noze jí chybí některé prsty. V únoru jsem si všiml, že sýkoře chybí některé prsty na obou nohách, ale i přesto se sýkora začala pohybovat po nohou viditelně lépe. Tuto sýkoru jsem zaznamenával průběžně až do dubna. Dne 1.4. se mi ji (samice +2K) podařilo odchytit do sklopky a zdokumentoval jsem deformaci obou končetin. Na levé noze byl přítomen pouze zadní prst a jeho pohyblivost byla minimální. Ostatní prsty byly zkrácené o první článek a srůstaly v pahýl. Na pravé noze byl přítomen zadní a přední vnitřní prst, po ostatních prstech zůstal jen zaschlý nekrotický zbytek (viz foto 11 a 12 v příloze). Sýkora byla přesto v poměrně dobré kondici (tučnost i vývin prsních svalů), pouze krycí opeření na břiše a na hlavě bylo dost opotřebované. Příčina tohoto handicapu mi není známa, je ovšem pozoruhodné, jak se s takovou ztrátou dokázala sýkora vyrovnat. V dubnu jsem sýkoru pozoroval, jak je schopná postavit se na úzké umělohmotné bidýlko u krmítka a přitom si nohou přidržovat semínko slunečnice. V této době se také na krmítku začala vyskytovat vždy se samcem, kterému zase chyběla všechna ocasní pera. Na ptáky číhá mnoho nebezpečí jak v přírodě, tak v urbánním prostředí a tyto případy ukazují, jak se ptáci někdy dokáží vypořádat s různými následky zranění či onemocnění.

L. Petrilák

### Deformita zobáku u racka bělohlavého (*Larus cachinnans*)

[*Bill deformity in a Caspian Gull (Larus cachinnans)*]

Dne 22.2.2012 jsem odečítal kroužky racků (*Larus* spp.) na skládce komunálního odpadu u Vysoké Pece (koordináty 50°31'N 13°29'E, kvadrát 5446, nadmořská výška 260 m n.m.; skládka komunálního odpadu v bývalé těžební jámě). Na skládce bylo přítomno 320 „velkých racků“, z nichž zhruba 90 % tvořili raci bělohlaví (*Larus cachinnans*) a 10 % raci stříbřítí (*Larus argentatus*). Společně s nimi se zde živil jeden racek polární (*Larus glaucooides*) a 91 racků bouřních (*Larus canus*). V hejnu jsem pozoroval racka bělohlavého v šatu první zimy s výrazně deformovaným zobákem (foto 13 v příloze). Zobák byl silně přerostlý, byl zhruba o jednu třetinu delší než normální zobák tohoto druhu. Nozdry byly umístěné zhruba v polovině zobáku, tedy výrazně dál od hlavy, než je typické. Špička zobáku byla mírně zahnutá dolů. Deformity zobáku u racků jsou v literatuře popsány a nejsou výjimečné (GIBBONS *et al.* 2010: *British Birds* 103: 142–183; <http://www.talk.gull-research.org/viewtopic.php?f=13&t=715>), konkrétní doklady z našeho území však chybí. Popisovaný racek v průběhu pozorování stál a nepřijímal potravu, ale evidentně byl v dobré kondici a deformovaný zobák mu nebránil v přijímání potravu.

V. Beran

### Abnormální zbarvení kosa černého (*Turdus merula*)

[*Abnormal colouration in a Common Blackbird (Turdus merula)*]

V letech 2010 a 2011 pozorovala Barbora Edlmanová se svojí babičkou Helenou Vydrovou na zahradě svého domu v Martinicích v Krkonoších (50°34'N 15°32'E, nadmořská výška 550 m n.m.) leucistického kosa černého (*Turdus merula*). Bílé zbarvení bylo patrné zejména na hlavě, která působila téměř kompaktně bíle jen s občasnými černými pery, výraznějším černým „vousem“ a skvrnou na temeni. Na zavřeném pravém křídle se vyskytovala jedna větší okrouhlá bílá skvrna a menší bílá páska (obr. 2, foto 14 v příloze). Kos byl pozorován opakovaně během dvou zimních sezón. Prvně byl pozorován 23.1.2010, kdy byla zahrada pokrytá sněhem. Kos se na zahradu opakovaně vracel a zůstal zde až do března. V následující zimě 2010/2011 byl opět opakovaně pozorován. Zdržoval se na nezasněženém místě pod živým plotem ze smrků, kde mohl sbírat potravu a ukrývat se. Na zahradě se nacházelo i krmítko, kos však na krmítko nelétal. S ostatními kosy, kteří se na zahradě pohybovali, se nedružil. V zimě 2011/2012 již nebyl pozorován. Nejbližší nám známé pozorování abnormálně zbarveného jedince kosa černého pochází z Turnovska (POJKAR 1961: *Zprávy ČSO* 7: 42), tj. 26 km od Martinic v Krkonoších.

B. Edlmanová & L. Štěpánová



**Obr. 2:** Abnormálně zbarvený kos černý (*Turdus merula*), Martinice v Krkonoších, 23.1.2010. Foto: B. Edlmanová.

**Fig. 2:** Abnormally coloured Common Blackbird (*Turdus merula*), Martinice v Krkonoších, 23.1.2010. Photo by B. Edlmanová.

**Pravděpodobný kříženec husy polní (*Anser fabalis*) a čírka modrozobá (*Anas versicolor*) v Ústí nad Labem**

[*Hybrid Bean Goose (Anser fabalis) and a Silver Teal (Anas versicolor) in Ústí nad Labem*]

Dne 31.10.2011 jsem byl kolegou J. Vondráčkem upozorněn, že se na pravém břehu Labe v centru Ústí nad Labem (koordináty 50°39'N 14°02'E, kvadrát 5350, nadmořská výška 140 m n.m.; travnatý břeh řeky Labe ve městě) zdržuje pravděpodobně husa krátkozobá (*Anser brachyrhynchus*). Okamžitě jsme společně vyjeli na místo, kde jsme v hejnu cca 50 kachen divokých (*Anas platyrhynchos*) pozorovali velmi krotkou mladou husu polní (*Anser fabalis*). Po konzultaci s ornitology D. Horalem, J. Horou a T. Koutným jsem došel k názoru, že se jedná o křížence (či zpětného křížence) husy polní pravděpodobně s husou čínskou (*Cygnopsis cygnoides*), a to na základě náznaku kresby na hlavě (foto 15 v příloze). Velmi pravděpodobně se jednalo o jedince uniklého z chovu – husa byla velmi krotká a její úniková vzdálenost před člověkem činila zhruba 2 m. Pták ale nebyl okroužkován. Na stejném místě se zdržovala až do konce roku. Taktéž 31.10.2011 jsme společně s J. Vondráčkem na stejné lokalitě pozorovali čírku modrozobou (*Anas versicolor*; foto 16 v příloze), která byla také velmi krotká, ale na rozdíl od husy polní byla kroužkováná. Šlo o jedince, který unikl ze ZOO v Ústí nad Labem. Při pokusu o její odchyt a návrat do ZOO dne 4.11.2011 však již nebyla zastížena a dále nebyla pozorována.

Václav Beran

ISSN 1211-6424

ISBN 978-80-87151-25-9

**+ foto v barevné příloze**

