

## HUSA VELKÁ (*Anser anser*) HNÍZDÍ NA PAR-DUBICKU

**Greylag goose (*Anser anser*) is nesting in the Par-dubice district**

**Vladimír LEMBERK**

Husa velká (*Anser anser*) hnizdí na území České republiky pravidelně v rybničních oblastech Třeboňské a Českobudějovické pánve a na Jižní Moravě (ŠŤASTNÝ et al., 1987). Před zrušením velkých rybníků v polovině 19. století bylo jejím hnizdištěm také Pardubicko. Od zmíněného období se zde husa velká vyskytuje buď pouze na tahu nebo ojediněle a nepravidelně od r. 1961 v okolí Lázni Bohdaneče i hnizdi (ŠTANCL et ŠTANCLOVÁ, 1987). Tato hnizdění byla prokázána pozorováním mláďat a týkala se rybníků Sopřeč, Rozhrna, Strašov a Bohdanečský (ŠTANCL et ŠTANCLOVÁ, 1995).

7.4.1994 mě upozornil Mgr. Jan Dolanský, že při výzkumu obojživelníků na rybníce Baroch, vzdáleném asi 6 km severně od Pardubic, vyplášil husu velkou, sedící pravděpodobně na hnizdě.

14.4.1994 se mi spolu s RNDr. Milanem Růžičkou z ČIŽP Pardubice podařilo hnizdo na rybníku Baroch nalézt. Při přiblížení k hnizdu létal samec vzrušeně nad námi a hlasem varoval samici sedící dosud na vejcích. Ta, i přestože mě viděla, opustila hnizdo teprve když jsem byl od něj asi 6 metrů.

Hnizdo husy velké bylo umístěno asi 35 metrů od jižního břehu rybníka Baroch. Rybník je z této strany lemován smíšeným lesem a loukou. Hnizdo bylo v řídkém porostu skřipince jezerního (*Schoenoplectus lacustris*) asi 3 metry od nevelké plochy volné vodní hladiny (rozměrů asi 10 x 50 m), obklopené souvislým rákosovým porostem. Hloubka vody pod hnizdem byla asi 80 cm. Z loňských (a v menší míře i z letošních) stébel rákosu postavené hnizdo obsahovalo 6 vajec v kotlince, vystlané prachovým peřím (viz. foto).

Rozměry hnizda (v závorce jsou uvedené hodnoty pro hnizda husí na vodě z literatury - HUDEC a ČERNÝ, 1972):

*průměr hromady rákosových stébel:* 97 cm (113 cm; 70-200 cm)

*vnější průměr hnizda:* 56 cm (49 cm; 37-65 cm)

*průměr kotlinky:* 29 cm (25 cm; 15-33 cm)

*hloubka kotlinky:* 11 cm (8 cm; 4-12 cm).

Obavy, zda vyplášení samice nepovede k jejímu opuštění hnizda, se ukázaly jako zbytečné 16.5.1994, kdy jsem na okraji volné vodní hladiny rybníka Baroch pozoroval oba rodiče hus velkých s 5 mladými.

## SOUHRN

V roce 1994 bylo prokázáno úspěšné vyhnízdění 1 páru husí velkých (*Anser anser*) na rybníku Baroch, vzdáleném 6 km severně od Pardubic. V návaznosti na údaje ŠTANCLA a ŠTANCLOVÉ (1995) se lze domnívat, že tento druh během posledních 5 let proniká do rybniční oblasti Pardubicka a Bohdanečska, kde hnízdí.

## SUMMARY

A couple of greylag goose (*Anser anser*) reared the young ones on the Baroch fishpond, 6 km north of Pardubice, in 1994.

## LITERATURA

- HUDEC, K., ČERNÝ, W., 1972: Fauna ČSSR, Ptáci I. Academia, Praha.  
ŠTANCL, L., ŠTANCLOVÁ, H., 1987: Ptactvo Pardubicka II. - Bohdanečsko. KMVČ, Pardubice.  
ŠTANCL, L., ŠTANCLOVÁ, H., 1995: Úspěšný pokus o reintrodukci husy velké (*Anser anser*) na rybnících Bohdanečska. Panurus, 6.  
ŠŤASTNÝ, K., RANDÍK, A., HUDEC, K., 1987: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

## ADRESA AUTORA:

Mgr. Vladimír Lemberk  
Východočeské muzeum  
Zámek čp. 2  
530 02 Pardubice



Foto: Hnízdo husy velké na rybníku Baroch u Pardubic (foto V. Lemberk).  
Foto: The nest of greylag goose on the Baroch fishpond in close neighbourhood of Pardubice (foto V. Lemberk).