

Jarní průtah potáplice severní (*Gavia arctica*) a potáplice malé (*Gavia stellata*) na Opatovsku

Spring migration of Black-throated Diver (*Gavia arctica*) and Red-throated Diver (*Gavia stellata*) in the Opatov area (East Bohemia)

Milan Janoušek

V České republice patří potáplice severní (*Gavia arctica*) a potáplice malá (*Gavia stellata*) k pravidelně migrujícím druhům (HUDEC et al. 1994). Potáplice jsou zastiňovány nejčastěji v období podzimního tahu (X,XI) nebo zimují na nezamrzajících vodních plochách větší rozlohy. Řidčeji jsou pozorovány v době jarního tahu, výjimečně se jejich výskyt protahuje až do letních měsíců. Z Opatovské (okres Svitavy) existoval dosud jediný jarní záznam potáplice severní - 1 ex. byl uloven dne 31.05.1958 na rybníku Hvězda (HUDEC et ČERNÝ 1972, doklad v coll. MOS v Přerově, SITKO 1979). V rámci sledování početnosti vodních ptáků na lokalitě Opatovské rybníky (čtverce mezinárodního síťového mapování 6164 a 6165, 422 m.n.m.) prováděné pravidelně zejména v posledních pěti letech byly oba druhy zaznamenány v průběhu května, v jednom případě se pobyt potáplice severní prodloužil až do počátku června.

Přehled pozorování

Potáplice severní (*Gavia arctica*)

1. 1 ex. ve svatebním šatě zjištěn dne 6.5.1995 na rybníce Hvězda (82 ha).
2. 1 ex. v prostém šatě pozorován od 18.5 do 2.6.1996 opět na rybníce Hvězda. Pták se na lokalitě zdržoval celkem 16 dní, nepůsobil plachým dojmem a občas se přiblížil až na vzdálenost 15-20 m od pozorovatele.

Potáplice malá (*Gavia stellata*)

1. 1 ex. (prostý šat) ve dnech 11.-29.05.1994 (tj. 19 dní) na rybníce Hvězda. Ani tento exemplář nebyl plachý a díky tomu se podařilo pořídit jeho dokumentární fotografii.
2. 1 ex. (prostý šat) pozorován 13. a 15.05.1995 poblíž hráze Nového rybníka (42 ha).

Je nutné dodat, že oba rybníky jsou intenzivně využívány pro chov ryb, a proto vytvářejí místo s dostatečnou potravní nabídkou vhodné i pro delší odpočinek migrujících potáplic. Závěrem bych chtěl poděkovat dalším autorům pozorování, členům ČSO M. Polákově a F. Jetmarovi za poskytnutí konkrétních dat.

Souhrn

Jednotlivé exempláře potáplice severní (*Gavia arctica*) a potáplice malé (*Gavia stellata*) byly zjištěny v době jarního průtahu na lokalitě Opatovské rybníky (okres Svitavy) v letech 1994-1996.

Summary

Black-throated Diver (*Gavia arctica*) and Red-throated Diver (*Gavia stellata*) were observed on Opatovské rybníky fishponds (District Svitavy, East Bohemia) during spring migration in May and at the beginning of June in 1994-1996.

Literatura

- ČERNÝ W., 1972: in Hudec K. et Černý W. et al., 1972: Fauna ČSSR.Ptáci I. Academia, Praha.
HUDEC K. et al., 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci I. Academia, Praha.
RYBKA V., 1990: Avifauna rybníků u Opatova, Diplomová práce Přír.fak.UP Olo-
mouc: 32. Ms.
SITKO J., 1979: Seznam dermoplastických preparátů, kožek a prsních kostí ze
sbírek MOS, Zprávy MOS, 37: 9-35.

Adresa autora :

Milan Janoušek
Lačnov 299
568 02 Svitavy

Obr.: Potáplice malá (*Gavia stellata*). Rybník Hvězda, 25.5.1994. Foto: M. Polák.

Fig.: Red-throated Diver (*Gavia stellata*). Hvězda fishpond, 25.5.1994. Foto: M. Polák.

