



**Foto 1:** Začátek pelichání křídla slavíka obecného (*Luscinia megarhynchos*), 19.7.2008, Koprník (okres Mladá Boleslav; k článku na str. 43). Foto P. Kverek.

**Photo 1:** The starting point of a wing moult in an adult Nightingale (*Luscinia megarhynchos*), 19th July 2008, Koprnik (Mladá Boleslav district; see page 43). Photo by P. Kverek.



**Foto 2:** S vypadnutím první loketní letky u slavíka obecného se křídlo stává natolik propustným, že pták téměř není schopen létat, 31.7.2007, Mladá Boleslav; k článku na str. 43. Foto P. Kverek.

**Photo 2:** After the loss of the first secondary flight feather during the moult, Nightingales become flightless. The adult bird on 31st June 2007, Mladá Boleslav; see page 43. Photo by P. Kverek



**Foto 3:** Křídlo slavíka obecného s plným počtem nově rostoucích letek, 29.7.2007, Býčina (okres Mladá Boleslav; k článku na str. 43). Foto P. Kverek.

**Photo 3:** A wing of the Nightingale with growing flight feathers, 29th June 2007, Býčina (Mladá Boleslav district; see page 43). Photo by P. Kverek.



**Foto 4:** Závěr úplného pelichání dospělých slavíků obecných obstarává nejčastěji pátá loketní letka, 18.8.2007, Bakov nad Jizerou (okres Mladá Boleslav; k článku na str. 43). Foto P. Kverek.

**Photo 4:** Ultimately during the moult in adult Nightingales, the fifth secondary flight feather is changed. The adult bird on 18th August 2007, Bakov nad Jizerou (Mladá Boleslav district; see page 43). Photo by P. Kverek



**Foto 5:** Hnízdo chocholouše obecného (*Galerida cristata*) s mláďaty dne 3.8.2007 u obce Nepoměřice (k článku na str. 53). Foto J. Křivský.

**Photo 5:** The nest of the Crested Lark (*Galerida cristata*) with young on 3rd August 2007 near Nepoměřice village (Kutná Hora district; see page 53). Photo by J. Křivský



**Foto 6:** Mládě chocholouše obecného, 22.6.2008, Nepoměřice (k článku na str. 53). Foto M. Kavka.

**Photo 6:** A young of the Crested Lark caught on 22nd June 2008 near Nepoměřice village (see page 53). Photo by M. Kavka.



**Foto 7:** Samice rákosníka tamaryškového (*Acrocephalus melanopogon*) chycená 4.5.2004 na Žehuňském rybníku (k článku na str. 65). Foto L. Urbánek  
**Photo 7:** Female Moustached Warbler (*Acrocephalus melanopogon*) caught on 4.5.2004 in the Žehuňský fishpond nature reserve (see page 65). Photo by L. Urbánek.



**Foto 8:** Rákosník ostřícový (*Acrocephalus paludicola*) chycený 6.5.2006 v NPR Žehuňský rybník (k článku na str. 65). Foto L. Urbánek.  
**Photo 8:** Aquatic Warbler (*Acrocephalus paludicola*) caught on 6.5.2006 in the Žehuňský fishpond nature reserve (see page 65). Photo by L. Urbánek.



**Foto 9:** Husa běločelá (*Anser albifrons*) a husa polní (*Anser fabalis*) na řece Jizeře v centru Železného Brodu dne 26.10.2006 (k článku na str. 77). Foto R. Fries.

**Photo 9:** White-fronted Goose (*Anser albifrons*) and the Bean Goose (*Anser fabalis*) on Jizera river in the Železný Brod city center (North Bohemia) on 26.10.2006 (see page 77). Photo by R. Fries.



**Foto 10:** Strnad malinký (*Emberiza pusilla*), chycený 7.10.2006 na Žehuňském rybníku (k článku na str. 99). Foto L.Urbánek.

**Photo 10:** Little Bunting (*Emberiza pusilla*) caught on 7.10.2006 in the Žehuňský fishpond nature reserve (see page 99). Photo by L. Urbánek.



**Foto 11:** Hnízdiště rehka domácího (*Phoenicurus ochruros*) v Orlických horách v uzavřeném prostoru půdy v roce 2007 – vnitřní prostor půdy s vyznačeným vletovým otvorem a umístěním hnízda (k článku na str. 81). Foto J. Porkert.

**Photo 11:** Breeding place of the Redstart (*Phoenicurus ochruros*) in Orlické mountains in an enclosed space of the loft in the year 2007 – interior of the loft with marked entrance hole (left) and the location of the nest (right; see page 81). Photo by J. Porkert.



**Foto 12:** Hnízdiště rehka domácího (*Phoenicurus ochruros*) v Orlických horách v uzavřeném prostoru půdy v roce 2007 – budova hájenky s vyznačeným vletovým a nejčastějším výletovým otvorem (k článku na str. 81). Foto J. Porkert.

**Photo 12:** Breeding place of the Redstart (*Phoenicurus ochruros*) in Orlické mountains in an enclosed space of the loft in the year 2007 – the chalet with marked entrance hole (right) and the most frequently used exit (left; see page 81). Photo by J. Porkert.



**Foto 13:** Sýkora modřinka (*Cyanistes caeruleus*) při krmení mláďat ve starém hnízdě jiřičky obecné (*Delichon urbica*) pod mostem přes Jizeru u Ploukonice (okres Semily), 20.5.2007 (k článku na str. 87). Foto J. Šťastný.

**Photo 13:** Blue Tit (*Cyanistes caeruleus*) feeding the young in an old nest of the House Martin (*Delichon urbica*) situated under the bridge. Jizera river near Ploukonice village (Semily district), 20th May 2007 (see page 87). Photo by J. Šťastný.



**Foto 14:** Konipas citrónový (*Motacilla citreola*) na Úpském rašeliništi v Krkonoších v roce 2008 (k článku na str. 95). Foto V. Pavel.

**Photo 14:** Citrine Wagtail (*Motacilla citreola*) on Úpské Mire in the Giant Mts. in 2008 (see page 95). Photo by V. Pavel.



**Foto 15:** Dvě sýkořice vousaté (*Panurus biarmicus*) v juvenilním opeření – v popředí samec, v pozadí samice (k článku na str. 109). Foto J. Klápková.

**Photo 15:** Bearded Tits (*Panurus biarmicus*) in juvenilie plumages – male in the foreground, female in the background (see page 109). Photo J. Klápková.



**Foto 16:** Mláďata výra velkého v prachovém peří, 16.5.2008, Brložské údolí na Přeloučsku (k článku na str. 111). Foto J. Kohoutek.

**Photo 16:** Nestlings of the Eagle Owl on 2.5.2008 in Brloch valley (Přelouč district; see page 111). Photo by J. Kohoutek.