



**Významné krajinné prvky Lanškrounské kotilly.**  
The meaningful landscape elements in the Lanškroun's hollow.

Mgr. Jaroslav JIRÁSEK, Lanškroun

*Práce přináší některé výsledky terénního průzkumu oblasti Lanškrounské kotilly v letech 1989 - 1991. Je zde podán přehled lokalit s výskytem přirozených nebo polopřirozených ekosystémů, stručně je popsána jejich vegetace, květena, opatření směřující k zachování jejich druhové rozmanitosti.*

Krajina Lanškrounské kotilly (fytogeografický podokres 63 j), která se nachází na pomezí východních Čech a Moravy, byla stejně jako mnohá jiná území po řadu staletí ovlivňována hospodařením lidské společnosti, které bylo příčinou řady změn (pozitivních i negativních) v původním vegetačním krytu. Zvláště v posledních desetiletích však tyto změny dosahují takových rozměrů, že dochází k destrukci celých ekosystémů, z krajiny mizí většina přirozených i polopřirozených kulturních společenstev a následně i rostlinné a živočišné druhy na tato společenstva vázané.

K zásahům působícím největší škody v krajině patří zejména převádění přirozených lesů na jehličnaté kultury, odvodňování mokřadů, rozorávání luk. Tímto hospodařením je dnes postižena převážná část rozlohy Lanškrounské kotilly. Krajina se tím stala ekologicky velice nestabilní, došlo k velkému poklesu biologické rozmanitosti. Možným řešením současného stavu by byla řízená ochrana částí krajiny s dosud zachovalými přírodními hodnotami a současně změna hospodaření na zbyvající ploše, která by umožnila alespoň částečný návrat přírodě blízkých ekosystémů do krajiny. K řešení tohoto problému si klade za cíl napomoci i tento příspěvek, který podává přehled zmíněných lokalit s dosud zachovalými přírodně blízkými ekosystémy.

Pro všechny okresy regionu východních Čech byly již zpracovány pardubickým střediskem ČÚOP (Faltysová et al. 1992) přehledy významných krajinných prvků. V Lanškrounské kotilině je popsáno 8 VKP. Tímto příspěvkem bych chtěl na tento přehled navázat, uvádím zde údaje o 59 lokalitách.

V popisu každého VKP jsou údaje o jeho lokalizaci, přibližné rozloze, umístění v kvadrantech síťového mapování. Přesnější údaje o lokalizaci VKP lze zjistit z mapy reálné vegetace, která je součástí diplomové práce (Jirásek 1992). Zde lze také najít informace o květeně a rostlinných společenstvech Lanškrounské kotilly.

Popis VKP obsahuje také stručné údaje o flóře, výskytu ohrožených druhů, současné vegetaci a návrhy optimální péče o tato území. Navrhoji zde také určitou kategorizaci VKP:

- I - území vhodná k vyhlášení zvlášť chráněného území,
- II - lokality, které lze považovat za biocentra,
- III - VKP s nižší přírodní hodnotou nebo malé rozlohy, mohou plnit úlohu biokoridorů či interakčních prvků při vytváření územních systémů ekologické stability.

**Legenda ke zkratkám způsobů péče o VKP :**

Sam - ponechání přirozených lesních společenstev samovolnému vývoji, nebo alespoň výrazně prodloužit dobu obmýt. Důvodem je vysoká biodiverzita vyspělých stadií ekosystémů.



## Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny

**Výb** - hospodaření v lesích způsobem jednotlivě až skupinově výběrným, prořezávky a probírky ve prospěch listnatých dřevin odpovídajících stanovišti, obnova v max. možné míře přirozená, cílová skladba dřevin podle typologických a geobotanických map

**Pře** - přeměna nepřirozených lesních kultur na území VKP, převážně smrčin a borů, hospodářský způsob pasečný, maloplošný, obnova přirozená popř. umělá s použitím dřevin odpovídajících stanovišti (typologické mapy)

**Kos** - kosení mezofilních a hygrophilních luk 1 - 2 x ročně

**Eut** - časté kosení, 2 - 3 x ročně, nelesních eurofizovávaných společenstev, omezení hnojení

**Skl** - pokosení a odklízení biomasy v mokřadních společenstvech ostřic a rákosin jednou za 3 až 5 let

**Pas** - extenzívní pastva ovcí a koz mírné intenzity na stráncích s teplomilnými společenstvy

**Dře** - odstraňování náletu keřů a stromů v nelesních společenstvech

**Roz** - rozšíření významného krajinného prvku, např. rozšíření lesních pásů vysázením dalších přirozených dřevin

C1 - kriticky ohrožené,  
C3 - ohrožené druhy,

C2 - silně ohrožené,  
C4 - vzácnější druhy vyžadující pozornost

### Přehled významných krajinných prvků řazených podle kvadrantů síťového mapování

#### 6065 c

- 1. - olšiny u Zadnho potoka u silnice Lanškroun-Jakubovice

rozloha cca 15 ha, kat. I, péče : Sam, Pře

lužní olšiny as. *Pruno-Fraxinetum, Stellario-Alnetum*

význačné druhy : *Colchicum autumnale, Iris pseudacorus, Lonicera nigra, Pulmonaria obscura, Carex appropinquata C2, Leucojum vernum C2, Daphne mezereum C3, Primula elatior C3, Valeriana dioica C3, Knautia drymeia C4.*

- 2. - rybníky od mokřadů za rybníkem Dlouhý až po mokřady za rybníkem Pšenčkův a mokřadní olšiny V od tohoto rybníka

rozloha cca 25 ha, kat. I, péče : Dře, Skl, Kos, Sam

velký počet mokřadních a lučních společenstev třídy *Phragmiti-Magnocaricetea* (včetně ohrožené as. *Caricetum appropinquatae*), svazů *Calthion, Molinion, Violion caninae, Arrhenatherion, Caricion fuscae*, lužní a bažinné olšiny

význačné druhy : *Achillea ptarmica, Carex acutiformis, C. elata, C. paniculata, C. pseudocyperus, Colchicum autumnale, Iris pseudacorus, Senecio rivularis, Stellaria palustris, Utricularia australis, Viola palustris, Carex appropinquata C2, C. cespitosa C3, C. hartmanii C3, Centaurium erythraea C3, Comarum palustre C3, Daphne mezereum C3, Dactylorhiza majalis C3, Menyanthes trifoliata C3, Primula elatior C3, Valeriana dioica C3, Crepis succisifolia C4, Centaurea macroptilon C4, Knautia drymeia C4*

- 3. - Lískový kopec Z od Lanškrouna

rozloha cca 6 ha, kat. III, péče : Výb, Kos

fragmenty suťových lesů, lužních olšin, společenstva as. *Ligusto-Prunetum, Trifolion medii, Arrhenatherion*

význačné druhy: *Allium oleraceum, Agrimonia eupatoria, Galium rotundifolium, Ranunculus polyanthemos, Trifolium montanum, Abies alba C3, Primula elatior C3, Aphanes arvensis C3.*



### 6065 d

- 4. - lesy v údolí potoka 1 km JV křížovatky v Albrechticích

rozloha cca 6 ha, kat. II, péče : Výb, Pře

suťové lesy as. *Aceri-Carpinetum*, olšiny as. *Arunco-Alnetum*

význačné druhy : *Actaea spicata*, *Carex elongata*, *Crepis paludosa*, *Geum rivale*, *Paris quadrifolia*, *Pulmonaria obscura*, *Tithymalus dulcis*, *Daphne mezereum* C3, *Primula elatior* C3, *Circaeae intermedia* C4

- 5. - lesíky 1 km V od obce Sázava

rozloha cca 7 ha, kat. III, péče : Výb, Kos, Roz

zbytky lesů svazu *Carpinion*, *Alnenion glutinoso-incanae*, *Salicion triandrae*, louky svazu *Arrhenatherion*, *Calthion*, *Trifolion medii*

význačné druhy : *Agrimonia eupatoria*, *Astragalus glycyphyllos*, *Centaurea scabiosa*, *Genista tinctoria*

---

### 6165 a

- 6. - olšiny 1,5 km S od Damníkova, Z od místa rozdvojení železniční trati, okolo rybníčka

rozloha cca 6 ha, kat. II, péče : Výb

mírně narušené lužní olšiny as. *Arunco-Alnetum*

význačné druhy : *Carex remota*, *Cirsium rivulare*, *Colchicum autumnale*, *Valeriana sambuci-folia*, *Leucojum vernum* C2, *Abies alba* C3, *Primula elatior* C3

- 7. - les mezi tratěmi ZJJZ od Damníkova

rozloha cca 5 ha, kat. III, péče : Výb, Pře

fragmenty lužních olšin as. *Stellario-Alnetum*, acidofilní podmáčená doubrava as. *Molinio arundinaceae-Quercetum*

význačné druhy : *Chrysosplenium alternifolium*, *Hieracium umbellatum*, *Molinia arundinacea*, *Leucojum vernum* C2, *Abies alba* C3, *Primula elatior* C3

- 8. - rybníky SV kostela v Rudolticích, louky a lesní okraje za rybníky

rozloha cca 8 ha, kat. II, péče : Kos, Skl, Výb

mokřady svazů *Phragmition*, *Caricion gracilis*, vlhké louky svazu *Calthion*, fragmenty lužních olšin, dubohabřin, na stráni za rybníky je porost teplomilné doubravy as. *Viscario-Quercetum*

význačné druhy : *Agrimonia eupatoria*, *Bidens cernua*, *Carex digitata*, *C. pseudocyperus*, *Caltha palustris*, *Inula conyzoides*, *Sparganium erectum*, *Viola hirta*, *Carex appropinquata* C2, *Leucojum vernum* C2, *Primula elatior* C3, *Ulmus minor* C3.



## **6165 b**

- **9. - břehy Moravské Sázavy na J okraji Žichlínka**  
rozloha cca 4 ha, kat. III, péče : Roz, Kos  
biokoridor tvořený vrbinami svazů *Salicion albae* a *Salicion triandrae*, zbytky luk svazu *Calthion*  
význačné druhy : *Bistorta major*, *Geranium phaeum*, *Humulus lupulus*, *Roegneria canina*,  
*Salix alba*
- **10. - pás lesů SSZ od Rychnova**  
rozloha cca 15 ha, kat. II, péče : Výb, Kos, Pře  
vedle smrčin jsou zde lesní porosty svazů *Carpinion*, *Tilio-Acerion*, *Alnenion glutino-so-incanae*, společenstva svazů *Caricion gracilis*, *Calthion*, *Arrhenatherion*, *Trifolion medii*  
význačné druhy : *Carex digitata*, *Convallaria majalis*, *Potentilla inclinata*, *Viola hirta*,  
*Melampyrum arvense* C2, *Carex cespitosa* C3, *Primula elatior* C3, *Knautia drymeia* C4.
- **11. - porosty podle trati Lanškroun - Rudoltice**  
rozloha cca 5 ha, kat. III, péče : Kos, Skl, Eut, Výb  
křoviny *Prunion spinosae*, *Salicion triandrae*, lemy a louky svazů *Trifolion medii*, *Arrhenatherion*, *Calthion*  
význačné druhy : *Agrimonia eupatoria*, *Cirsium canum*, *Trifolium medium*, *Valeriana officinalis*, *Melampyrum arvense* C2.
- **12. - louky na J okraji Lubnáka**  
rozloha cca 5 ha, kat. II, péče : Kos, Skl  
vlhké louky as. *Cirsietum rivularis*, *Trifolio-Festucetum alopecuretosum*, *Filipendulenion*,  
vrbové křoviny as. *Salicetum triandrae*  
význačné druhy : *Bistorta major*, *Caltha palustris*, *Cirsium canum*, *C. rivulare*
- **13. - les na Červeném pahorku v Lukové**  
rozloha cca 6 ha, kat. III, péče : Výb, Pře, Kos  
narušené lesy svazů *Carpinion*, *Genisto-Quercion*, louky svazů *Arrhenatherion*, *Calthion*,  
*Violion caninae*  
význačné druhy : *Anemone nemorosa*, *Convallaria majalis*, *Polygonatum multiflorum*,  
*Primula elatior* C3
- **14. - olšiny u potoka na V konci Lukové**  
rozloha cca 4 ha, kat. III, péče : Sam, Roz, Kos, Eut  
fragmenty lužních a bažinných olšin as. *Carici acutiformis-Alnetum*, *Alnenion glutino-so-incanae*  
význačné druhy : *Bidens cernua*, *Bistorta major*, *Carex acutiformis*, *C. elongata*, *Colchicum autumnale*, *Solanum dulcamara*, *Carex appropinquata* C2, *Primula elatior* C3
- **15. - Koží rybník JV od Lukové**  
rozloha cca 6 ha, kat. III, péče : Kos, Skl, Eut  
eutrofizované mokřadní společenstva svazů *Calthion*, *Salicion triandrae*, *Phragmition*,  
*Caricion gracilis*  
význačné druhy : *Colchicum autumnale*, *Valerina officinalis*, *Carex cespitosa* C3, *Arctium nemorosum* C4

**6165 b**

- 16. - les podél potoka 2 km SV od Květné  
rozloha cca 8 ha, kat. III, péče : Výb, Pře  
lužní olšiny, fragmenty dubohabřin a acidofilních doubrav  
význačné druhy : *Chaerophyllum hirsutum*, *Convallaria majalis*, *Valeriana sambucifolia*, *Primula elatior* C3, *Knautia drymeia* C4

**6165 c**

- 17. - okraj lesa Z od Mladějova  
rozloha cca 5 ha, kat. III, péče : Výb, Kos  
fragmenty bučin, louky svazu *Arrhenatherion*, společenstva svazu *Trifolion medii*  
význačné druhy : *Actaea spicata*, *Atropa bella-donna*, *Galium boreale*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Trifolium campestre*

**6165 d**

- 18. - SV část Rychnovského vrchu, 1 km S od vrcholu,  
údolí potoka tekoucího do Moravské Sázavy  
rozloha cca 20 ha, kat. I, péče : Sam, Pře, Kos, Skl  
zahrnuje větší počet přirozených a polopřirozených společenstev s výskytem mnoha ohrožených druhů. Jsou zde suťové lesy as. *Mercuriali-Fraxinetum* s výskytem *Daphne mezereum* C3, *Abies alba* C3, *Circaea alpina* C4, *Epipactis purpurata* C4, *Tithymalus amygdaloïdes* C4, prameniště svazu *Cardaminion amarae* s výskytem *Poa remota* C3, *Thelypteris palustris* C3, olšiny as. *Stellario-Alnetum* s druhy *Leucojum vernum* C2, *Primula elatior* C3, *Knautia drymeia* C4, zbytky mokřadů s *Carex appropinquata* C2, *C. cespitosa* C3, *Scrophularia umbrosa* C4, louky as. *Cirsietum rivularis* a svazu *Arrhenatherion*.  
další význačné druhy : *Colchicum autumnale*, *Dentaria bulbifera*, *Melica uniflora*, *Senecio rivularis*, *Stellaria holostea*, *Platanthera bifolia* C3, *Circaea intermedia* C4

- 19. - lipové lesy 0,5 km SV vrcholu Rychnovského vrchu  
rozloha cca 10 ha, kat. II, péče : Výb  
podrost odpovídá květnatým bučinám as. *Melico-Fagetum*  
význačné druhy : *Galium odoratum*, *Hypericum hirsutum*, *Lysimachia nemorum*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Veronica montana*, *Daphne mezereum* C3, *Arctium nemorosum* C4

- 20. - vrchol Rychnovského vrchu a okolí  
rozloha cca 10 ha, kat. II, péče : Sam, Pře  
květnaté bučiny as. *Melico-Fagetum*, fragmentárně suťové lesy,  
ve sníženině mokřad as. *Caricetum gracilis*, *Salicetum auritae*  
význačné druhy : *Adoxa moschatellina*, *Atropa bella-donna*, *Cardamine impatiens*, *Hepatica nobilis*, *Monotropa hypophaea*, *Neottia nidus-avis*, *Stellaria holostea*, *Cephalanthera damasonium* C3, *Daphne mezereum* C3



## **6165 d**

- 21. - louky na SZ úpatí Rychnovského vrchu nad obcí rozloha cca 15 ha, kat. II, péče : Kos, Dře, Eut převažují mezofilní louky svazu *Arrhenatherion*, intenzívne obhospodařované, pásy křovin *Prunion spinosae*, lemy svazu *Trifolion medii*, na okraji narušené dubohabřiny a suťové lesy, na S okraji zbytek vlhké louky as. *Cirsietum rivularis*význačné druhy : *Agrimonia eupatoria*, *Colchicum autumnale*, *Eriophorum angustifolium*, *Potentilla verna*, *Ranunculus polyanthemos*, *Senecio rivularis*, *Carex appropinquata* C2, C. *cespitosus* C3, C. *davalliana* C3, *Dactylorhiza majalis* C3, *Eleocharis cf. uniglumis* C3, *Gentianopsis ciliata* C3, *Platanthera bifolia* C3, *Valeriana dioica* C3, *Ornithogalum umbellatum* C4
- 22. - les Z od Rychnovského vrchu, 0,5 km SV od kostela v Rychnově rozloha cca 10 ha, kat. III, péče : Výb, Kos, Skl narušené porosty acidofilních doubrav a bučin, mokřiny as. *Caricetum gracilis*, *Cirsietum rivularis*, křoviny *Prunion spinosae*, louky svazu *Arrhenatherion*, *Violion caninae* význačné druhy : *Colchicum autumnale*, *Inula salicina*, *Senecio rivularis*, *Stellaria palustris*, *Succisa pratensis*, *Carex appropinquata* C2, *Aphanes arvensis* C3, *Primula elatior* C3, *Valeriana dioica* C3
- 23. - rybníček JV Mladějova rozloha cca 5 ha, kat. III, péče : Výb mokřady *Phragmiti-Magnocaricetea*, degradované lesy *Alnenion glutinoso-incanae*, *Genisto germanicae-Quercion* význačné druhy : *Caltha palustris*, *Cardamine amara*, *Crepis tectorum*, *Equisetum fluviatile*, *Ranunculus lanuginosus*, *Sparganium erectum*, *Primula elatior* C3
- 24. - les okolo trati 1,5 km JV Mladějova rozloha cca 10 ha, kat. II, péče : Výb, Pře fragmenty doubrav a olšin as. *Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum*, *Alnion glutinosae*, *Molinion* význačné druhy : *Betonica officinalis*, *Carex elongata*, *Cirsium rivulare*, *Epipactis helleborine*, *Melampyrum pratense*, *Rhodococcum vitis-idaea*, *Abies alba* C3
- 25. - lesíky JZ Radišova rozloha cca 5 ha, kat. III, péče : Výb, Roz, Kos, Eut fragmenty bikových doubrav as. *Luzulo-Quercetum*, *Calthion* význačné druhy : *Convallaria majalis*, *Hieracium umbellatum*, *Ranunculus polyanthemos*, *Solidago virgaurea*, *Steris viscaria*
- 26. - les 0,5 km JZ od Květné rozloha cca 20 ha, kat. II, péče : Výb, Pře, Kos, Skl mokřadní olšiny, maloplošný výskyt dubohabřin as. *Melampyro-Carpinetum abietetosum* a podmáčených doubrav *Molinio arundinaceae-Quercetum*, louky svazu *Calthion* význačné druhy : *Carex rostrata*, *Cirsium rivulare*, *Galium odoratum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Iris pseudacorus*, *Lonicera nigra*, *Sanicula europaea*, *Senecio rivularis*, *Trollius altissimus* C2, *Abies alba* C3, *Primula elatior* C3, *Arctium nemorosum* C4

**6165d**

## • 27. - rybník 2 km VJV od Květné, lesy podél potoka

rozloha cca 5 ha, kat. III, péče : Výb, Roz

rákosiny, lužní olšiny, podél potoka dubohabrový les

význačné druhy : *Convallaria majalis, Potamogeton natans, Stellaria holostea, Primula elatior C3, Knautia drymeia C4*

## • 28. - lesík 1 km S od Mladějova

rozloha cca 4 ha, kat. III, péče : Výb, Pře, Skl

degradované lužní olšiny a bučiny

význačné druhy : *Galium odoratum, Ulmus glabra, Primula elatior C3***6166 a**

## • 29. - les S nad řekou, 1 - 2 km SV Krasíkova

rozloha cca 10 ha, kat. I, péče : Sam, Pře, Kos

suťové lesy as. *Aceri-Carpinetum, Mercuriali-Fraxinetum*, dubohabrové lesy, louka svazu *Arrhenatherion*, lemy *Trifolion medii*význačné druhy : *Agrimonia eupatoria, Campanula persicifolia, Carex pilosa, Cuscuta epithymum, Epipactis helleborine, Melica uniflora, Origanum vulgare, Potentilla recta, Scabiosa ochroleuca, Stellaria holostea, Daphne mezereum C3, Primula elatior C3, Arum alpinum C4, Circaea intermedia C4, Knautia drymeia C4, Tithymalus amygdalooides C4*

## • 30. - les mezi silnicí a řekou 1 km SV Krasíkova

rozloha cca 6 ha, kat. I, péče : Sam, Kos

druhově bohatý les as. *Melampyro-Carpinetum*, fragmenty olšin a vrbin, porosty svazů *Prunion spinosae a Trifolion medii*význačné druhy : *Agrimonia eupatoria, Campanula persicifolia, Carex digitata, Epipactis helleborine, Hepatica nobilis, Polygonatum latifolium, Ranunculus polyanthemos, Stellaria holostea, Knautia drymeia C4, Tithymalus amygdalooides C4*

## • 31. - lesy nad pravým břehem M. Sázavy V od Krasíkova

rozloha cca 20 ha, kat. I, péče : Sam, Pře

místy velmi dobře zachovalé suťové lesy as. *Aceri-Carpinetum*význačné druhy : *Adoxa moschatellina, Atropa bella-donna, Bromus benekenii, Epipactis helleborine, Festuca altissima, Gymnocarpium dryopteris, Hedera helix, Abies alba C3, Daphne mezereum C3, Primula elatior C3, Dentaria enneaphyllos C4, Rosa pendulina C4, Tithymalus amygdalooides C4*

## • 32. - les mezi obcemi Tatenice a Krasíkov

rozloha cca 3 ha, kat. III, péče : Výb, Kos

narušený suťový les, louka as. *Trifolio-Fesucetum rubrae*význačné druhy : *Actaea spicata, Agrimonia eupatoria, Cardamine amara, Lonicera xylosteum, Primula elatior C3*



### 6166 a

- 33. - údolí Hraničního potoka 1 km S od Tatenic

rozloha cca 20 ha, kat. II, péče : Výb, Pře, Kos

narušený les svazu *Carpinion*, lužní podhorská olšina as. *Arundo-Alnetum*, břehové porosty svazu *Calthion*, *Petasition*, oligotrofní louka as. *Polygono-Nardetum*

význačné druhy : *Allium ursinum*, *Epipactis helleborine*, *Festuca altissima*, *Lysimachia nemorum*, *Polypodium vulgare*, *Sanguisorba minor*, *Thalictrum aquilegiifolium*, *Valeriana sambucifolia*, *Abies alba* C3, *Daphne mezereum* C3, *Primula elatior* C3, *Circaeae intermedia* C4, *Rosa pendulina* C4

- 34. - údolí Tateničky 0,5 km V od Tatenic

rozloha cca 10 ha, kat. II, péče : Sam, Pře, Kos, Eut

lesní porosty as. *Melampyro-Carpinetum luzuletosum*, *Aceri-Carpinetum*, *Salicetum triandrae*, *Alnenion glutinoso-incanae*, louky svazů *Calthion*, *Violion caninae*

význačné druhy : *Aquilegia vulgaris*, *Campanula persicifolia*, *Carex digitata*, *Festuca altissima*, *Ulmus glabra*, *Aphanes arvensis* C3, *Primula elatior* C3, *Knautia drymeia* C4

---

### 6166 c

- 35. - údolí v SV části Rychnovského lesa zakončené rybníkem Rohlíček

rozloha cca 6 ha, kat. II, péče : Výb, Dře

mokřady as. *Caricetum cespitosae* s *Carex cespitosa* C3, pobřežními porosty *Calamagrostis villosa* s druhu *Veratrum lobelianum* a *Primula elatior* C3, olšiny as. *Stellario-Alnetum* s *Knautia drymeia* C4 a u rybníka společenstva mokřadů svazů *Oenanthon*, *Phragmition*, *Batrachion aquatilis*, v horní části údolí, pod svahem hřebenu Rychnovského vrchu jsou olšiny as. *Arundo-Alnetum* a *Carici remotae-Fraxinetum*

další význačné druhy : *Carex bohemica*, *Colchicum autumnale*, *Lonicera nigra*, *Senecio rivularis*, *Utricularia australis*, *Daphne mezereum* C3

- 36. - V okraj Rychnovského lesa, 2 km JZ Prostředního rybníka

rozloha cca 5 ha, kat. III, péče : Výb

dubohabřiny, lužní olšina as. *Stellario-Alnetum*

význačné druhy : *Actaea spicata*, *Allium ursinum*, *Cardamine amara*, *Paris quadrifolia*, *Valeriana sambucifolia*, *Daphne mezereum* C3, *Primula elatior* C3, *Knautia drymeia* C4

- 37. - údolí potoka 2 km JV od Třebařova

rozloha cca 8 ha, kat. III, péče : Výb, Pře, Kos, Eut

fragmenty dubohabřin, acidofilních doubrav, bučin, luk svazů *Calthion*, *Violion caninae*

význačné druhy : *Actaea spicata*, *Cirsium canum*, *Galium sylvaticum*, *Melampyrum nemorosum*, *Tithymalus dulcis*, *Abies alba* C3, *Knautia drymeia* C4

- 38. - rybník u řeky Z od Prostředního rybníka

rozloha cca 3 ha, kat. II, péče : Dře, Skl

vodní a mokřadní společenstva jednotek *Lemnetea*, *Potametea*, *Phragmiti-Magnocaricetea*, *Calthion*, *Salicion triandrae*

význačné druhy : *Caltha palustris*, *Lemna trisulca*, *Sparganium emersum*, *Utricularia australis*, *Carex cespitosa* C3



### 6166 c

- 39. - rybník Prostřední u Krasíkova

rozloha cca 15 ha, kat. III, péče : Výb, Skl

narušené porosty svazů *Phragmition*, *Prunion spinosae*, lužních olšin svazu *Alnenion glutinoso-incanae*

význačné druhy : *Bidens cernua*, *Carex bohemica*, *Cirsium canum*, *Oenanthe aquatica*, *Rhamnus cathartica*

### 6265 b

- 40. - rybník 1 km J od Nové Vsi

rozloha cca 2 ha, kat. II, péče : Skl, Dře, Výb, Pře

vodní a mokřadní společenstva - *Potametea*, *Caricion gracilis*, *Calthion*, lužní olšiny svazu *Alnenion glutinoso-incanae*

význačné druhy : *Bidens cernua*, *Carex acutiformis*, *C. paniculata*, *Convallaria majalis*, *Senecio rivularis*, *Sparganium emersum*, *Nymphaea candida* C2

- 41. - olšiny na SV okraji Udánského lesa 1 km S hájovny, Z od Udánek  
u Moravské Třebové

rozloha cca 6 ha, kat. II, péče : Výb, Pře, Kos

mokřadní a lužní olšiny as. *Calamagrostio canescens-Alnetum*, *Arunco-Alnetum*, narušené mokřady svazů *Calthion* a *Phragmition*

význačné druhy : *Asarum europaeum*, *Carex elongata*, *C. paniculata*, *C. remota*, *Cardamine amara*, *Cirsium rivulare*, *Crepis paludosa*, *Galium elongatum*, *Geum rivale*, *Ranunculus lanuginosus*, *Scutellaria galericulata*, *Abies alba* C3, *Cerastium lucorum* C4

- 42. - SZ okraj Udánského lesa pod železniční vlečkou, 1 km S kóty 633

rozloha cca 4 ha, kat. II, péče : Sam, Pře

suťové lesy as. *Mercuriali-Fraxinetum*, lužní olšiny as. *Arunco-Alnetum*

význačné druhy : *Actaea spicata*, *Carex remota*, *Epipactis helleborine*, *Festuca altissima*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Lycopodium clavatum*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Petasites albus*, *Sanicula europaea*, *Tithymalus dulcis*, *Abies alba* C3, *Daphne mezereum* C3, *Cerastium lucorum* C4, *Lycopodium annotinum* C4

- 43. - les pod silnicí, pod lomem, 5 km Z od Mor. Třebové

rozloha cca 10 ha, kat. II, péče : Sam, Pře

květnaté bučiny as. *Melico-Fagetum*, potoční olšiny as. *Carici remotae-Fraxinetum*

význačné druhy : *Actaea spicata*, *Bromus benekenii*, *Carex remota*, *Epipactis helleborine*, *Festuca altissima*, *Galium rotundifolium*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Hordelymus europaeus*, *Melica uniflora*, *Paris quadrifolia*, *Sanicula europaea*, *Ulmus glabra*, *Veronica montana*, *Abies alba* C3, *Cephalanthera damasonium* C3, *Daphne mezereum* C3, *Primula elatior* C3, *Valeriana dioica* C3



### **6265 b**

- 44. - mokřiny podél potoka v J části Udánského lesa, 4 km Z Udánek  
rozloha cca 20 ha, kat. II, péče : Výb, Skl  
lužní a mokřadní olšiny as. *Arunco-Alnetum*, svazu *Alnion glutinosae*, mokřady třídy *Phragmiti-Magnocaricetea*, svazu *Calthion*, rašelinné březiny as. *Betuletum pubescentis*  
význačné druhy : *Carex demissa*, *C. echinata*, *C. nigra*, *C. paniculata*, *C. remota*, *C. rostrata*, *Cirsium rivulare*, *Eriophorum angustifolium*, *Geum rivale*, *Molinia coerulea*, *Selinum carvifolia*, *Primula elatior* C3, *Valeriana dioica* C3

- 45. - jižní část vrchu Zlatník V od Kunčiny  
rozloha cca 15 ha, kat. II, péče : Kos, Pas, Dře  
teplomilná nelesní a křovinná společenstva tříd *Sedo-Scleranthetea*, *Festuco-Brometea*, svazů *Violion caninae*, *Prunion spinosae*, *Arrhenatherion*  
význačné druhy : *Acinos arvensis*, *Bromus erectus*, *Hieracium lactucella*, *Jasione montana*, *Potentilla recta*, *Sanicula europaea*, *Trifolium arvense*, *Filago arvensis* C3, *Jovibarba sobolifera* C3, *Knautia drymeia* C4

### **6265 d**

- 46. - lesy a stráně na Panském vrchu JZ Útěchova  
rozloha cca 4 ha, kat. II, péče : Výb, Pře, Dře, Kos, Pas  
dubohabřiny - svaz *Carpinion*, jehličnaté kultury, na V svahu teplomilná společenstva svazů *Bromion erecti*, *Violion caninae*, *Arrhenatherion*  
význačné druhy : *Actaea spicata*, *Agrimonia eupatoria*, *Anthemis tinctoria*, *Bromus erectus*, *Campanula persicifolia*, *Centaurea scabiosa*, *Epipactis helleborine*, *Galium rotundifolium*, *Koeleria pyramidata*, *Medicago falcata*, *Origanum vulgare*, *Paris quadrifolia*, *Potentilla heptaphylla*, *Pyrus pyraster*, *Salvia verticillata*, *Sanguisorba minor*, *Sanicula europaea*, *Trifolium montanum*, *Botrychium lunaria* C3, *Cephalanthera damasonium* C3, *Gentianopsis ciliata* C3, *Primula veris* C3

- 47. - lesy a louky v údolí Třebůvky mezi Útěchovem a Dlouhou Loučkou  
rozloha cca 10 ha, kat. II, péče : Výb, Pře, Kos, Eut  
fragmenty dubohabřin svazu *Carpinion*, degradované louky svazu *Calthion*, na březích as. *Petasitetum hybridi*  
význačné druhy : *Acinos arvensis*, *Anthemis tinctoria*, *Campanula persicifolia*, *Dentaria bulbifera*, *Galium sylvaticum*, *Hepatica nobilis*, *Hypericum hirsutum*, *Libanotis pyrenaica*, *Melampyrum nemorosum*, *Pulmonaria obscura*, *Stellaria holostea*, *Cephalanthera damasonium* C3, *Knautia drymeia* C4

- 48. - lesík u potoka 1 km Z od Útěchova  
rozloha cca 2 ha, kat. III, péče : Výb, Roz  
narušená dubohabřina - svaz *Carpinion*  
význačné druhy : *Convallaria majalis*, *Campanula persicifolia*, *Genista tinctoria*, *Viola riviniana*



## 6265 d

- 49. - stráně V nad Dlouhou Loučkou

rozloha cca 20 ha, kat. I, péče : Dře, Kos, Pas, Výb

teplomilná travinobylinná společenstva jednotek *Diantho deltoidis-Festucenion rupicolae*, *Violion caninae*, *Trifolion medii*, *Arrhenatherion*, křoviny as. *Ligstro-Prunetum*, lesy svazu *Carpinion*

význačné druhy : *Actaea spicata*, *Adoxa moschatellina*, *Agrimonia eupatoria*, *Anthemis tinctoria*, *Aquilegia vulgaris*, *Bromus erectus*, *Centaurea scabiosa*, *Chamaecytisus supinus*, *Convallaria majalis*, *Festuca rupicola*, *Helianthemum grandiflorum*, *Hepatica nobilis*, *Inula salicina*, *Lathyrus vernus*, *Libanotis pyrenaica*, *Ligustrum vulgare*, *Origanum vulgare*, *Picris hieracioides*, *Polygala comosa*, *Potentilla heptaphylla*, *Ranunculus polyanthemos*, *Rhinanthus serotinus*, *Salvia verticillata*, *Sanguisorba minor*, *Trifolium medium*, *Melampyrum arvense* C2, *Daphne mezereum* C3, *Gymnadenia conopsea* C3, *Juniperus communis* C3, *Platanthera bifolia* C3, *Primula veris* C3

- 50. - rybník SZ od Boršova a mokřiny Z silnice, SZ obce

rozloha cca 15 ha, kat. III, péče : Kos, Dře, Výb

rákosiny, louka svazu *Violion caninae*, za silnicí lužní olšina, druhotná březina význačné druhy : *Bistorta major*, *Carex paniculata*, *C. pseudocyperus*, *C. remota*, *Sherardia arvensis*, *Solanum dulcamara*, *Sparganium erectum*, *Succisa pratensis*, *Valerianella dentata*, *Salix rosmarinifolia* C3

- 51. - les a louky Z od Boršova

rozloha cca 10 ha, kat. II, péče : Výb, Kos

lužní olšiny as. *Arunco-Alnetum*, louky svazu *Calthion*

význačné druhy : *Astrantia major*, *Centaurea scabiosa*, *Colchicum autumnale*, *Crepis paludosa*, *Geum rivale*, *Melampyrum nemorosum*, *Origanum vulgare*, *Ranunculus lanuginosus*, *Succisa pratensis*, *Primula elatior* C3, *Valeriana dioica* C3, *Knautia drymeia* C4

- 52. - přirozené lesy pod svahy Hřebče na Z okraji Boršovského lesa, 1,5 km SSZ a 1 km JV kóty 660 (Roh)

rozloha celkem cca 7 ha, kat. II, péče : Sam, Pře

květnaté bučiny as. *Melico-Fagetum*, paseky svazu *Atropion*

význačné druhy : *Allium ursinum*, *Atropa bella-donna*, *Cardamine impatiens*, *C. flexuosa*, *Dentaria bulbifera*, *Festuca altissima*, *Galium rotundifolium*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Hordelymus europaeus*, *Melica uniflora*, *Sanicula europaea*, *Veronica montana*, *Ulmus glabra*, *Abies alba* C3, *Cephalanthera longifolia* C3, *Daphne mezereum* C3, *Lycopodium annotinum* C4

## 6266 a

- 53. - střední část údolí Borušovského potoka J od silnice u Borušova, Z od Gruny u Moravské Třebové

rozloha cca 10 ha, kat. III, péče : Pře, Výb, Kos, Eut

jehličnaté kultury se zbytky dubohabřin (*Carpinion*), olšin (*Alnenion glutinoso-incanae*), společenstva svazů *Petasition* a *Trifolion mediivýznačné druhy* : *Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Campanula persicifolia*, *Cardamine amara*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Convallaria majalis*, *Galeobdolon montanum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Lathyrus vernus*, *Lonicera xylosteum*, *Luzula luzuloides*, *Mercurialis perennis*, *Paris quadrifolia*, *Pulmonaria obscura*, *Swida sanguinea*, *Vaccinium myrtillus*, *Daphne mezereum* C3.



### 6266 a

- 54. - les S od silnice, 1 km JZ od Gruny, J od kravína

rozloha cca 5 ha, kat. III, péče : Dře, Kos

křoviny svazu *Prunion spinosae* a teplomilné lemy svazu *Trifolion medii*

význačné druhy : *Agrimonia eupatoria*, *Astragalus glycyphyllos*, *Betonica officinalis*, *Clino-podium vulgare*, *Epilobium hirsutum*, *Malva moschata*

### 6266 c

- 55. - les nad silnicí Z pod zříceninou hradu Radkova v údolí Třebůvky

rozloha cca 4 ha, kat. II, péče : Sam, Pře

dubohabrové lesy as. *Melampyro-Carpinetum* a suťové lesy as. *Aceri-Carpinetum*, jehličnaté kultury

význačné druhy : *Acer campestre*, *Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Bromus benekenii*, *Campanula persicifolia*, *Galium sylvaticum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Lonicera xylosteum*, *Mercurialis perennis*, *Polypodium vulgare*, *Polystichum aculeatum*, *Pulmonaria obscura*, *Stellaria holostea*, *Tithymalus dulcis*, *Ulmus glabra*, *U. minor*, *Viola riviniana*, *Tithymalus amygdaloides* C4, *Rosa pendulina* C4

### 6266 d

- 56. - lesy a louky v údolí 1,5 km SV od Radkova, S od Uzavřeného pole

rozloha cca 10 ha, kat. III, péče : Pře, Výb, Kos, Eut

v různé míře degradovaná společenstva dubohabřin, lužních olšin (*Carpinion*, *Alnenion glutinoso-incanae*), pcháčové vlhké louky svazu *Calthion*, jehličnaté kultury

význačné druhy : *Caltha palustris*, *Galium sylvaticum*, *Geranium phaeum*, *Solanum dulcamara*, *Stellaria holostea*

- 57. - lesy v údolí a lesní okraje 1km V od Radkova, J od Uzavřeného pole

rozloha cca 8 ha, kat. III, péče : Výb, Pře, Kos, Eut

narušené dubohabřiny, acidofilní bučiny a doubravy, svazy *Carpinion*, *Luzulo-Fagion*, *Genisto-Quercion*, lemy svazu *Trifolion medii*, jehličnaté kultury

význačné druhy : *Actaea spicata*, *Campanula persicifolia*, *Centaurea scabiosa*, *Convallaria majalis*, *Galium odoratum*, *Lathyrus vernus*, *Lemnopus nigricans*, *Melampyrum nemorosum*, *Paris quadrifolia*, *Polygonatum multiflorum*, *Stellaria holostea*, *Trifolium medium*, *T. montanum*, *Daphne mezereum* C3

- 58. - Petrůvka - pestrá mozaika společenstev v blízkém okolí obce,

louky na březích řeky JV obce, stráně S a V obce

rozloha cca 20 ha, kat. II, péče : Kos, Dře

mezofilní a vlhké louky as. *Cirsietum rivularis*, *Arrhenatheretum*, *Alopecuretum pratensis*, porosty rákosu, lužní olšiny, stráně hostí teplomilná společenstva jednotek *Bromion erecti*, *Arrhenatheretum elatioris salvietosum*, křoviny as. *Ligastro-Prunetum*, lemy svazu *Trifolion medii*

význačné druhy : *Acer campestre*, *Agrimonia eupatoria*, *Ajuga genevensis*, *Bistorta major*, *Bromus erectus*, *Caltha palustris*, *Carex acutiformis*, *C. cespitosa*, *C. flacca*, *Carlina vulgaris*, *Cirsium rivulare*, *Colchicum autumnale*, *Fragaria viridis*, *Geum rivale*, *Hieracium bauhinii*, *Origanum vulgare*, *Polygala comosa*, *Ranunculus polyanthemos*, *Sanguisorba minor*, *Saxifraga granulata*, *Scrophularia umbrosa*, *Senecio rivularis*, *Valerianella locusta*, *Viola hirta*, *Melampyrum arvense* C2, *Anthemis cotula* C3.



## 6365 b

- 59. - les 1 km JZ od Dlouhé Loučky  
rozloha cca 10 ha, kat. II, péče : Výb, Pře  
borové kultury s příměsí dubu a buku, bylinně patro místy odpovídá acidofilním doubravám  
as. *Luzulo albidae-Quercetum*  
význačné druhy : *Convallaria majalis*, *Frangula alnus*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Molinia coerulea*, *Knautia drymeia* C4

### **Literatura :**

- ANONYMUS (1987) : Regionálně fytogeografické členění ČSR. Praha, mapa.
- FALTYSOVÁ et al. (1992) : Významné krajinné prvky východních Čech. - Pardubice.
- HOLUB J., PROCHÁZKA F. et ČEŘOVSKÝ J. (1979) : Seznam vyhynulých, endemických a ohrožených taxonů vyšších rostlin květeny ČSR. - Preslia, Praha, 51 : 213-237.
- JIRÁSEK J. (1992) : Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. Pr. depon. in Kat. Bot. Přírod. Fak. Univ. Karl. Praha].
- MORAVEC J. et al. (1983) : Rostlinná společenstva České socialistické republiky a jejich ohrožení. - Severočes. Přír., Litoměřice, příloha 1983/1 : 1-110.

### **SUMMARY.**

#### **The meaningful landscape elements in the Lanškroun's hollow.**

This contribution presents a review and characterization of meaningful landscape elements in Lanškrounská kotlina (Lanškroun's hollow) - localities with so far saved natural values. The territory in East Bohemia in question is under intensive economic employment, natural vegetation is here only in rests. For every meaningful landscape element is described his vegetation, there is a list of significant and endangered plant species. Here is proposed a care of particular localities too, most frequently it is restoration of mowing of meadows, conversion of wood cultures to natural forests, leaving of natural forest communities for spontaneous development.

Adresa autora : Mgr. Jaroslav JIRÁSEK  
Svobody 620  
563 01 Lanškroun

