



NÁLEZY UŽOVKY OBOJKOVÉ NA ČESKO – MORAVSKÉM POMEZÍ

Findings of grass snake on Bohemian – Moravian borderland

Oldřich KOPECKÝ

U Rybníčku 416, Ústí nad Orlicí, Hylváty 562 03,
e-mail: olda.kopecky@email.cz

Ve dnech 13.6.2004 a 4.9.2004 jsem narazil, při terénních exkurzích na Králícku a Hanušovicku, na užovku obojkovou (*Natrix natrix*, Linnaeus, 1758). Obě lokality, na nichž byly nálezy učiněny, jsou pro daný druh atypické. Jeden z nálezů je v daném faunistickém čtverci prvním nálezem užovky obojkové.

První užovka byla chycena na východní hranici přírodního parku Jeřáb v nadmořské výšce 800 m n. m. Tento nález spadá do faunistického čtverce č. 5966. V tomto čtverci, dle posledního mapování plazů (MIKÁTOVÁ & kol. 2001), užovka obojková již objevena byla. Nicméně daný oficiální nález, jenž učinila roku 1996 B. Mikátová, pochází z obce Červený potok o téměř 250 výškových metrů níže. Hora Jeřáb (1003 m n. m.) je porostlá hlavně smrkovou monokulturou.

V září jsem pak učinil nález užovky obojkové ve faunistickém čtverci č. 5867, tedy v místě, z něhož nebyl tento druh dříve hlášen (viz. ŠTĚPÁNEK 1955, SKLENÁŘ & ROČEK 1979, MIKÁTOVÁ & kol. 2001). Užovka byla nalezena mrtvá na asfaltové silnici na severním konci obce Sklené (okres Šumperk, kraj Olomoucký) v nadmořské výšce 745 m n. m., cca 15 m od rozcestníku turistických tras. Nedaleko nálezu protéká říčka Malá Morava a spolu s bezejmenným potůčkem zde vytváří podmáčený soutok porostlý olšinou. Asi 50 m východně od místa nálezu je právě na Malé Moravě vytvořena malá vodní elektrárna

Souhrn

Lokality obou nálezů je možné označit za netypické. Jako běžná je totiž užovka obojková udávána z našeho území z elevací do 500 (ZWACH 1990) až do 700 m n. m. (BARUŠ & OLIVA 1992) a spíše z rovinatého terénu (MIKÁTOVÁ & kol. 2001). Nález z faunistického čtverce č. 5867 doplňuje nálezy z předešlých mapování (ŠTĚPÁNEK 1955, SKLENÁŘ & ROČEK 1979, MIKÁTOVÁ & kol. 2001) v nichž nebyla přítomnost užovky obojkové zaznamenána. Spolu s nálezem ve faunistickém čtverci č. 5866 (KOPECKÝ 2004), kompletuje údaje o rozšíření našeho nejběžnějšího hada na zapomenutém a i zoologicky málo prozkoumaném česko – moravském pomezí.

Summary

During year 2004 I found two grass snakes on atypical localities on a Bohemian – Moravian borderland. First award was on the mountain Jeřáb (1003 m a.s.l.) in elevation 800 m. Mountain Jeřáb is overgrown mostly by pine wood. Second award was on the end of village Sklené on crossroad of tourist paths (745 m a.s.l.). This second award is historically first record of grass snake in this faunistical square (square number 5867).



Literatura

- BARUŠ V. & OLIVA O., 1992: Fauna ČSFR – Obojživelníci. *Academia, Praha*.
- KOPECKÝ O., 2004: Užovka obojková pod Kralickým Sněžníkem. *Živa* 5, 223.
- MIKÁTOVÁ B. & VLAŠÍN M. & ZAVADIL V., 2001: Atlas rozšíření plazů v České republice. *Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno, Praha*.
- SKLENÁŘ J. & ROČEK Z., 1979: Zoogeografie obojživelníků a plazů východních čech. *Kraj-
ské muzeum, Hradec Králové*.
- ŠTĚPÁNEK O., 1955: Plazi a obojživelníci oblasti Králického Sněžníku. *Čas. Nár. Musea,
odd. přírodověd., 124: 75-76*.

Došlo: 21.2.2006

