



Foto 1: Návrší Kozí hřbet severovýchodně od Petrušova (k článku na str. 3).
Photo 1: Hill Kozí hřbet (ridge) in north-eastern part of the Petrušov (see page 3).



Foto 2: Vrcholový hřbet Cukrové boudy – pohled od jihovýchodu (k článku na str. 3).
Photo 2: Top ridge od the Cukrová bouda hill from south-east (see page 3).



Foto 3: Voštinové mikroformy zvětrávání a odnosu metamorfitů zábřežského krystalinika na stěně mrazového srubu na vsv. svahu Cukrové boudy (k článku na str. 3). Foto 1–3 J. Vítek.

Photo 3: Honeycomb microforms of weathering and denudation of metamorphites of the Zábřeh Crystalline Unit on the frost-riven cliff wall on ENE slope of the Cukrová bouda hill (see page 3). Photo 1–3 by J. Vítek.



Foto 4: Kamenný most na Divoké Orlici v Zemské bráně (k článku na str. 15).

Photo 4: The stone bridge over the river Divoká Orlice in the Zemská brána (see page 15).



Foto 5: Zarovnané povrchy střední části Orlických hor s údolím Divoké Orlice – při hranici s Polskem, oblast Zemské brány (k článku na str. 15).

Photo 5: Etchplains of the central Orlické hory mountains with the Divoká Orlice valley, in the Zemská brána area (see page 15).



Foto 6: Balvanité řečiště Divoké Orlice v oblasti Zemské brány (k článku na str. 15). Foto 4–6 E. Vaničková.

Photo 6: The boulder riverbed of the Divoká Orlice in the Zemská brána area (see page 15). Photo 4–6 by E. Vaničková.



Foto 7: Obnovený rybník Roudnička (k článku na str. 43).

Photo 7: Restorated Roudnička pond (see page 43).



Foto 8: Kyprej yzopolistý (*Lythrum hyssopifolia*) na obnažených plochách rybníka Roudnička (k článku na str. 43).

Photo 8: *Lythrum hyssopifolia* on the exposed bottoms of Roudnička pond (see page 43).



Foto 9: Nový druh šáchor tmavý (*Cyperus fuscus*) v PP Roudnička a Datlík (k článku na str. 43). Foto 7–9 R. Prausová.

Photo 9: The new species *Cyperus fuscus* in the natural landmark Roudnička and Datlík (see page 43). Photo 7–9 by R. Prausová.



Foto 10: Polykormon *Carex pediformis* subsp. *rhizodes* v době utváření květenství (23.3.2007, k článku na str. 175). Foto Mikeska.

Photo 10: *Carex pediformis* subsp. *rhizodes* – formation of an inflorescence (23.3.2007, see page 175). Photo by Mikeska.



Foto 11: Lýkovec jedovatý (*Daphne mezereum*) – detail plodů (k článku na str. 85).
Photo 11: *Daphne mezereum* – detail of fruit (see page 85).



Foto 12: Okrotice bílá (*Cephalanthera damasonium*) – detail květenství (k článku na str. 85).

Photo 12: *Cephalanthera damasonium* – image detail of the flower head (see page 85).



Foto 13: Záběr na zachovalý fragment dubohabřiny – Jány (k článku na str. 85).
Photo 13: View of well-preserved fragment of oak-hornbeam-grove – Jány (see page 85).



Foto 14: Zapalice žluťuchovitá (*Isopyrum thalictroides*) – detail květenství (k článku na str. 85). Foto 11–14 J. Málková.
Photo 14: *Isopyrum thalictroides* – image detail of the flower head (see page 85). Photo 11–14 by J. Málková.



Foto 15: Sněžěnka podsněžník (*Galanthus nivalis*) na lokalitě u Opatova (k článku na str. 179). Foto Pavel Novák.

Photo 15: *Galanthus nivalis* on locality near Opatov (see page 179). Photo by Pavel Novák.



Foto 16: Boreokontinentální bor v Hedvikovské rokli (k článku na str. 219). Foto J. Moravec.

Photo 16: Boreo-continental pine forest in the Hedvikovská gorge (see page 219). Photo by J. Moravec.



Foto 17: Sameček a samička snovačky stolové (*Achaeearanea tabulata*) (k článku na str. 217).
Photo 17: Cobweb spider (*Achaeearanea tabulata*) – male and female (see page 217).



Foto 18: Samička snovačky stolové (*Achaeearanea tabulata*) s kokonem (k článku na str. 217). Foto 17–18 R. Macek.
Photo 18: Cobweb spider (*Achaeearanea tabulata*) – female with egg sac (see page 217). Photo 17–18 by R. Macek.



Foto 19: Blatnice skvrnitá (*Pelobates fuscus*), u Lázní Bohdaneč, 4.4.2006 (k článku na str. 225). Foto V. Lemberk.

Photo 19: Common Spadefoot (*Pelobates fuscus*), near Lázně Bohdaneč, 4.4.2006 (see page 225). Photo by V. Lemberk.



Foto 20: Louka pod Voseckou boudou v roce 2006 (po aplikaci herbicidu na populaci *Rumex alpinus* L., k článku na str. 159). Foto A. Wagner 2006.

Photo 20: The meadow bellow the Vosecká bouda chalet in 2006 (after application of herbicide on the population of *Rumex alpinus* L., see page 159). Photo by A. Wagner 2006.